

dente en dessinant un arc plus ou moins effacé. Lobes frontaux encore plus étendus que chez *Steigeri*. Vu de face et en projection, leur angle externe paraît plus rapproché du bord latéral de la tête que l'épaisseur moyenne du scape. (Egal à cette épaisseur chez *Steigeri*). Le scape dépasse d'environ un quart de sa longueur le bord postérieur de la tête. Articles 2. à 9. du funicule plus épais que longs. Epistome tronqué devant avec deux faibles carènes prolongeant les lobes frontaux. Le bord antérieur arqué et légèrement relevé. Les crêtes cervicales et dorsales du thorax plus accentuées que chez *Steigeri* surtout devant. Face basale de l'épinotum un peu convexe, deux et demi fois plus longue que la déclive et formant ensemble un angle net. Profil du pétiole plus allongé que chez *Steigeri*, son nœud plus bas, plus déprimé et plus long mais pas plus large. Postpétiole cupuliforme, peu rugueux, aussi long que large au quart postérieur, le dessus faiblement convexe, sans impression et avec deux petites dents dessous. Gastre faiblement bordé dans son tiers antérieur.

Brésil : Sao Paulo (LUEDERWALDT) 2 ♂.

Apterostigma Mayri FOR st. **discrepans** FOR.

Brésil, Sainte Catharina. Blumenau. (REICHENSBERGER leg).

Deux ♂ ne différant du type que par la couleur plus sombre du corps.

Iridomyrmex impotens n. sp.

♂. — Long 1.8 mm. Noir brunâtre, gastre noir. Epistome et appendices brun moyen avec les mandibules et les derniers tarses roux jaunâtre. Luisante, lisse avec un réticulum microscopique. Pubescence extrêmement fine ne ternissant pas l'éclat de la sculpture. Quelques longs poils au bord de l'épistome et au bout du gastre.

Tête d'un sixième à un cinquième plus longue que large, très nettement rétrécie devant, les côtés convexes, le bord postérieur presque droit (à peine convexe) avec les angles arrondis et rentrants. Yeux au tiers antérieur de la tête, peu convexes, aussi grands que leur distance au bord antérieur de la tête. Sillon et aire frontaux effacés. Epistome un peu convexe, largement mais peu profondément échancré devant. Les mandibules lisses ont deux dents devant que suivent cinq denticules. Le scape dépasse de près d'un quart de sa longueur le bord postérieur de la tête. Le promésonotum forme une forte courbe, régulière, du col au au sillon métanotal, un peu plus convexe que chez *I. despertita* FOR. La face basale de l'épinotum aussi convexe que chez cette espèce mais