

un peu plus courte, longue comme environ les deux tiers de la face déclive. L'écaille atteint à peine la moitié de la hauteur de la face antérieure du gastre contre laquelle elle est accolée.

Brésil : Blumenau (REICHENSBERGER leg). 1 ♀.

Iridomyrmex humilis MAYR. st. **angulata** EM. var. **pulex** n. var.

♀. — Long. 1.8 mm. Outre la taille plus petite, cette variété diffère de *angulata* EM. par le funicule rembruni vers le bout. La tête et le thorax plus mats et le gastre plus luisant. Moins pubescente. Le scape dépasse moins nettement le bord postérieur de la tête. Du reste comme *angulata* EM.

Brésil : Blumenau (REICHENSBERGER) 2 ♀.

Camponotus (Neomyrmamblys) Inca EM. st. **rector** n. st.

Diffère de *Inca* comme suit. Une ponctuation extrêmement fine donne un aspect velouté, mat. Même aspect sur le gastre dont la sculpture est beaucoup plus fine que chez *punctulatus*. La pubescence du thorax et du devant du gastre d'un jaune grisâtre est assez copieuse pour donner l'aspect d'une pelisse ; elle est longue mais ne cache pas la sculpture, et moins confluyente ailleurs. Scape, base des antennes et tarses roux ferrugineux, le reste des appendices brun rouge avec les cuisses et les tibias presque noirs.

♂. — La tête, vue de front, a le bord postérieur rectiligne (concave chez *Inca*) (d'après la figure) bien que la face occipitale soit concave. Le profil du thorax comme chez *C. punctulatus* MAYR. L'écaille est plus haute et bien moins convexe devant que chez cette espèce, avec le sommet assez mince mais mousse. La pilosité dressée, blanc jaunâtre ; est un peu plus abondante que chez *C. personatus* EM.

Tête ; longueur 2.9 mm., large derrière 2.1 mm., tibias postérieurs 2.2 mm. Chez la ♀ le scape dépasse des deux cinquièmes le bord postérieur de la tête.

♀. — Long. 11 mm. La tête est plus étroite que chez le ♂. Son bord postérieur droit. Le scape le dépasse légèrement. Les ailes sont un peu jaunâtres, longues de 9 mm. Du reste comme chez *C. Inca*.

Brésil : Minas Geraes, Piracicabo (E. LUIA).

Eciton amazona n. sp.

♂. — Long. 10.5 mm. (sans les mandibules). Roux fauve ; tête jaune roussâtre ; scape et tarses ferrugineux ; mandibules, funicule et