

Description de quelques nouvelles fourmis du Brésil, par le dr. F. Santschi

PONERA REICHENSBERGERI n. sp. ✓

♀ Long 2 mm. Jaune roussâtre, gastre un peu plus foncé, assez luisant. Pubescence assez abondante, courte sur la tête et le thorax, plus longue sur le gastre laissant partout voir la sculpture finement ponctuée. Appendices un peu moins luisants et plus densément pubescents. Quelques aux deux bouts du corps.

Tête rectangulaire à peine plus large derrière que devant, environ un tiers plus longue que large. Le bord postérieur droit ou à peine concave; les côtés faiblement convexes. Yeux de 1 à 2 facettes placés très en avant, à 1 1/2 ou 2 fois leur diamètre du bord antérieur de la tête. Sillon frontal distinct et court dépassant légèrement les arêtes frontales il réapparaît au tiers antérieur de la tête sous forme d'une petite fossete. Epistome court, avec une carène étroite et assez saillante. Mandibules luisantes, lisses avec quelques petits points épars leur bord externe rectiligne dans ses 3/4 basaux, armées de 4 petites dents devant et denticulées derrière. Le scape est distant de son épaisseur du bord postérieur de la tête; articles 2 à 6 du funicule environ le double plus épais que long. L'avant dernier est encore un peu plus large que long et le dernier environ trois fois plus long que large et aussi long que les trois articles précédents réunis. Thorax un peu plus étroit que la tête. La suture promesonotale très distincte la mesoepinotale beaucoup plus faible et peu apparente. Le profil forme une longue et faible convexité jusqu'à l'angle épinotal avec une trace d'impression au niveau des sutures. Pronotum distinctement plus long que large, sa plus grande largeur un peu en arrière du milieu. Mésonotum presque aussi long que large. Face basale de l'épinotum rectangulaire, un quart à un tiers plus longue que large convexe d'un côté à