

l'autre. Face déclive bordée plus faiblement concave au centre, les bords un peu convexes en haut et concaves en bas, forment un angle net mais mousse avec la face basale. Ecailles aussi hautes que le gastre, deux fois plus hautes au dessus des pedicules que longues sur le profil, le sommet environ le double plus mince que la base, ou de dessus, il paraît deux fois et demi plus large que long au milieu, le devant convexe d'un côté à l'autre, la face postérieure plane. Le post petiole est légèrement plus long que large ses cotes convergent assez directement vers ceux de l'écaille.

Voisin *clavatula* Em. Mais beaucoup plus gracile, diffère aussi de *P. Schwebeli* par ses yeux beaucoup plus avancés.

Bresil : Santa Catharina, Blumenau (Reichensperger leg) ♂ ♂.

PONERA SCHWEBELI FOR

♂ (non décrite) Long. 2 a 2, 2 mm. Jaune roussâtre, derrière de la tête et le gastre brun jaunâtre, mandibules très luisantes, le reste un peu moins, pubescent. Tête plus large derrière. Yeux d'une facette au quart antérieur des côtés. Sillon frontal atteignant le milieu de la tête. Epistome plus large que chez *Reichenspergeri*; la carène distincte. Les huit premières dents mandibulaires petites mais assez distinctes suivies de trois ou quatre denticules.

Le scape atteint presque le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 6 du funicule le double plus epais que longs, articles 7 à 9 aussi longs qu'epais, le 10^e un quart plus epais que long. Le dernier aussi long que l'ensemble de trois précédents. Face déclive de l'épinotum bordée. Ecaille haute, à sommet plus aminci que chez *P. Reichenspergeri* et, 2 1/2 à 3 fois plus large que long et régulièrement arrondi dans son bord supérieur. Post-pétiole distinctement plus large que long.

Brésil : Sta Catharina, Blumenau (A. Reinchensperger leg).