

1 ♀ en mauvais état correspond à la description de la ♀ décrite par m^r Forel comme variété de *P. parva*, mais il s'agit d'une espèce bien distincte.

PONERE NEGLECTA n. sp. ✓✓

♂ Long. 2,5 mm. Voisin de *trigona* et *opaciceps* mais plus ténue. Brun noirâtre du noir brunâtre, le gastre plus foncé, les appendices jaune brunâtre terne.

Submate. La tête presque mate, plus densément et finement ponctuée que le reste. Pubescence partout très abondante, grisâtre, quelques poils dressés aux deux bouts du corps.

Tête rectangulaire un quart à un tiers plus longue que large (bien plus étroite que chez *opaciceps* et *trigona*) aussi étroite derrière que devant, les cotés à peine arqués, le bord postérieur droit ou très faiblement concave, la face occipitale concave. Yeux de 1 à 2 facettes placés au cinquième antérieur des côtes. Sillon frontal dépassant à peine les arêtes frontales qui atteignent le tiers antérieur de la tête. Epistome assez court, carène a bord antérieur régulièrement arqué. Mandibules assez luisantes leur bord terminal un quart à un cinquième plus long que le bord interne et armé de 3 ou quatre dents distinctes devant et subdenticulées derrière. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Articles 2 à 10 du funicule beaucoup plus épais que longs à peu près comme chez *clavatula* Em. Thorax encore un peu plus étroit que la tête, le dos très peu convexe sur le profil, la suture mésoépino-tale très imprimée mais l'épinotum reste sur le même plan que le mesonotum. Pronotum allongé ses épaules effacées. Le mésonotum est presque aussi long que large et aussi long que la face basale de l'épinotum. Celle-ci est assez déprimée, subbordée rectangulaire, environ un quart à un tiers plus longue que large. La face déclive un peu plus courte aussi large et également bordée que la basale, formant avec elle un angle net de 115° environ. Écaille plus haute que l'épinotum, dépassant même légère-