

notum comme chez *P. Iheringi* For. La face basale de l'épinothum est plus droite. Vu de dessus le thorax est plus étroit que chez cette dernière espèce. Pronotum plus long que large. Mesonotum un peu plus large que long. La face basale de l'épinothum convexe d'un côté à l'autre, étroite devant, élargie et un peu échancrée derrière, aussi longue que la face déclive, celle-ci est plane bordée, et fait un angle de 115° avec la précédente. Ecaille aussi élevée que le devant du gastre, environ deux fois plus haute que longue sur le profil, la moitié plus courte au sommet qu'à la base, des deux faces légèrement convexes de haut en bas, le bord supérieur arqué. Vu de dessus elle est environ deux fois plus large que longue en demi cercle devant, faiblement arqué derrière. Post petiole un peu plus large que long, plus court que le segment suivant. Tarses d'un seul éperon.

Brésil: Santa Catharina, Blumenau. (A. Reichensperger leg). Diffère de *P. Foreli* par ses yeux beaucoup plus petits, de *Iheringi* par son port beaucoup plus étroit.

ECITON LATIDENS Sants var <sup>u</sup>*morulus* n. var

♂ Noire. Diffère du type par ses ailes beaucoup plus sombres, noirâtres (brun jaunâtres chez le type) thorax plus large que robuste, (3,5 mm au lieu de 3,2 mm). Les yeux plus petits, plus distants des ocelles. La large dent des mandibules est plus dégagée. Pubescence moins abondante, pour le reste comme chez le type.

Guyane française. St. Laurent du Maroni (Le Moutl leg) 1 ♂.

ECITON DULCIUS For. Cette espèce ne paraît pas avoir de soldats et se place de ce fait, à côté de *E. rapax* Sm.

ECITON VAGANS Ol.

Les exemplaires cités par M. Luederwaldt dans ses « Neue Brasilianische Ameisen, São Paulo 1920