

p 10) » sous le nom de *E. dulcius* et qu'il m'a envoyé avec les Ns. 18467 et 19101, se rapportent à *E. vagans*. dont la couleur varie un peu. Le type, d'après Latreille, est d'un brun noirâtre et a le gastre jaune, il provient de la Guyane (le N° 18467 se rapporte au type). M. Luederwaldt m'a également envoyé sous le nom de var *francanum* Ihering (N° 17768) Franca, Etat de Sao Paulo, — des exemplaires d'un brun rougeâtre assez clair et à gastre jaune clair. J'ai également reçu cette variété de M. Forel sous le nom de *quadriglume* San Bernardino Paraguay. (Fubrig) Je pense qu'on peut conserver le nom de *francanum* Ihering à cette variété plus claire, ce nom étant encore *in lit.* Les mandibules des ♀ sont variables, une dent apparaît parfois au milieu de leur bord interne.

ECITON QUADRIGLUME Hal

Cette belle espèce est facile à distinguer par sa couleur noir et mate chez les ♀ et dont la tête et le dessus du thorax vire au rouge sombre chez les ♂. Les épines epinotales sont bien plus longues que leur intervalle.

ECITON (LABIDUS) COECUM Latr. var GRASSATOR For

Cette variété est facile à distinguer des autres formes du *coecum* par sa couleur foncée. (Le type est « fauve marron » d'après Latreille, les ♀ sont plus dimorphes que chez la var suivante.

Bresil : Blumenau et frontière Bolivienne (A. Reinchensperger).

ECITON (LABIDUS) COECUM Latr. var SELYSI For

Les plus grands exemplaires que j'ai sous les yeux atteignent 5,2 mm. La tête n'est pas, relativement, plus grande que celle des ♀ plus petits. Cette variété est facile à distinguer par ses mandibules à bord terminal plus oblique, sa couleur roussâtre avec le front obscur.

Brésil : Santa Catharina, Encone alto (Reichen-sperger).