

ECITON (LABIDUS) COECUM Latr. v. Sayi, Hald.

Les ♀ des Etats Unis (Texas, Austin, Wheeler) que j'ai sous les yeux ont les côtés du pronotum lisses et luisants alors qu'ils sont finement réticulés et sub opaques chez le type du Brésil. Le pédicule est plus long, moins fortement polymorphe, de couleur plus claire sans tache frontale. Haldeman a décrit un ♂ de *coecum* auquel je pense que se rapportent les ♀.

ECITON (ACAMATHUS) EMERYI Sant.

(Bul. Soc. Vaud. S. N. Vol 54. 1921 p. 92 note) (partim).

ECITON (ACAMATHUS) D'ORBIGNY Em (Mem. R. Acc. Soc. Bologna T VIII 1900 p. 515 et 526 pg. 11) non Shuckard.

ECITON (ACAMATHUS) EMERYI Sants. Vor. EXAGONA n. var.

♀ Long 14 mill. Brun chatain foncé, partie distale du funicule, tarsi, partie des tibiai, bords des segments inférieur du gastre et genitalia brun rougeâtre jaune. Une pubescence abondante laisse voir la sculpture assez luisante et finement ponctuée.

La tête forme un hexagone irrégulier environ un tiers plus large que haut, (un quart plus large chez le type; voir la fig. e. c. p 526 fig. 11). L'espace entre les yeux et les ocelles plus long que l'intervalle entre ces derniers (à peu près égale chez le type). Funicule plus épais à la base 1^e article un tiers plus court que le suivant, lequel est environ un quart plus long qu'épais. Thorax beaucoup plus large que la tête, (3,4 mill) avec un profil comme chez *E. A. Strobeli*. Mayr. Pétiole plus court que chez cette dernière espèce, les angles antérieurs arrondis et le dessus une peu plus convexe. Le bord postérieur est presque droit. Le dessous comme chez *Strobeli*. Ailes roussâtres à nervures brun roussâtre, longues de 14 mm.

Perou. Cailoma (Le Mout) 1 ♂.