

75. — *Aenictogiton emeryi* FOR.

Congo belge : Kambove XI. 1918 (Dr. GERARD) 2 ♂, et Lusindoï  
27. VIII. 1911 (L. BURGEON) 1 ♂. Musée du Congo.

CLÉ ANALYTIQUE DES *AENICTOGITON* ♂.

1. — Atteignant 8 mm. et plus . . . . . 2  
— Plus petits . . . . . 3
2. — Pétiole aussi long que large, pilosité du thorax assez courte  
*fossiceps* EM.  
— Pétiole distinctement plus long que large, pilosité du thorax  
plus longue . . . . . *schoutedeni* n. sp.
3. — Pétiole 1 1/4 plus large que long (d'après Forel) . *bequaerti* FR.  
— Pétiole aussi long ou plus long que large . . . . . 4
4. — Pétiole aussi large que long, tête élargie derrière les yeux  
*sulcatus* SANTS.  
— Tête à côtés parallèles derrière les yeux, pétiole un peu plus  
long que large . . . . . 5
5. — Plus svelte, ne dépassant pas 5,5 mm. . . *attenuatus* SANTS.  
— Atteignant 6 mm. . . . . 6
6. — Epinotum lisse, pétiole un peu plus court . . . *emeryi* FOR.  
— Epinotum orné de gros points, pétiole plus long.  
*elongatus* SANTS.

76. — *Aenictus vagans* n. sp. (fig. 3).

♂ Long : 6,5 mm. D'un roux gris verdâtre, les pattes plus rous-  
sâtre, la tête noire passant devant au brunâtre. Occiput, métanotum  
et le bout de l'abdomen (sauf l'extrême bord du pygidium) très lui-  
sants et lisses, le reste a une fine ponctuation pilifère et paraît moins  
luisant. Pilosité dressée courte et dense partout sauf sur les places  
très luisantes.

Tête aussi large que le thorax. Vue de dessus (côté des ocelles) la  
face antérieure paraît peu concave avec son tiers moyen droit ou à  
peine convexe; les bords postéro-latéraux presque droits. Le bord  
occipital concave. Le clypeus échancré entre les crêtes frontales.  
Les yeux occupent tous les côtés de la face antérieure. Ocelles équi-