

ou moins parallèlement pour s'anastomoser vers le bord postérieur de la tête. Le lit du scape est ponctué et nettement bordé. Entre ce dernier et l'œil 3 rides longitudinales, comme celles des côtés de la tête. Thorax plus grossièrement et irrégulièrement ridé en long. Deux fortes rides transversales vont d'une épaule du pronotum à l'autre en arrière desquelles les rides sont assez serpigineuses. Quelques grosses côtes espacées sur les nœuds du pédoncule entre lesquelles la sculpture est lisse et luisante comme le gastre, la face déclive de l'épinotum et les appendices.

Tête rectangulaire, à peine plus longue que large, plus courte que chez *guineense*. Son bord postérieur un peu concave; les latéraux droits s'arrondissent vers les angles. Yeux un peu en avant du milieu des côtés et à peine plus petits que chez *guineense*. Les arêtes frontales s'écartent d'abord jusqu'au niveau des yeux puis vont parallèlement vers le bord postérieur de la tête qu'ils atteignent en s'amincissant et s'écartant de nouveau vers les angles postérieurs. Epistome convexe, ridé en long, la ride médiane plutôt plus faible que les autres, le bord antérieur étroitement échancré au milieu. Mandibules lisses, leur bord terminal plus court que chez *guineense*, armé de 4 ou 5 dents espacées. Le scape atteint presque le bord postérieur de la tête (le funicule manque chez mon unique exemplaire). Thorax déprimé et découpé latéralement comme chez *guineense* mais plus court. La face basale de l'épinotum plus large que longue. Les épines sont le double plus longues que chez cette espèce, et aussi divergentes. Les épines épisternales bien plus courtes, dentiformes et réunies aux précédentes par une crête qui borde la face déclive. Le pédicule du pétiole un peu plus long que le nœud. Celui-ci, vu de profil, est plus haut que long, son bord supérieur horizontal, ses faces antérieures et postérieures subverticales. Le sommet est près d'un tiers plus large que long. Postpétiole d'un quart à un cinquième plus large que le pétiole, les côtés arrondis, le sommet subaccuminé sur le profil et la face antérieure oblique. Gastre court.

Assez voisin de *guineense* par sa couleur, sa sculpture et l'aspect général, elle s'en distingue assez par ailleurs pour prendre le rang d'espèce.

Congo belge : Kunungu (Dr. H. SCHOUTEDEN), 1 ♀, au Musée du Congo à Tervueren.