

Pétiole un quart plus long que large devant; ses bords relevés dans leur moitié antérieure et presque droits, convergent un peu en arrière; les angles antérieurs nets. Faiblement convexe sur le profil, le devant de l'article se confond au milieu avec sa face déclive. Un appendice tronqué occupe le tiers antérieur de sa face inférieure carénée. Le postpétiole, à peine plus large que le pétiole, a une forte crête transversale, fortement bidentée, qui le divise en deux faces supérieures, l'antérieure concave transversalement, la postérieure convexe. Une dent marque le devant de son bord inférieur.

Gastre lentiforme, un cinquième plus long que large, échancré et bordé devant. Cuisses larges et ridées.

Congo belge : Kasai, Ngombe (Dr. H. SCHOUTEDEN, 5 XI 1921).

Cette curieuse espèce est très caractéristique par son épinothum. Elle se rapproche de *C. lobatus* MAYR, mais ce dernier a l'épinothum épineux.

119. — *Cataulacus Wissmanni* FOR. v. *striativentris* n. sp.

Long : 3,5 mm. Diffère du type (d'après la description) par la sculpture non distinctement réticulée-punctuée entre les rides du thorax et les stries du gastre. Celles-ci sont complètement développées sur le dos et leur sillon plus étroit que l'épaisseur des rides. Pour le reste semblable.

Congo belge : Ubanghi, Banzyville (R. P. AUGUSTIN); — Haut Uele, Moto (L. BURGEON).

120. — *Cataulacus lujae* FOR.

♀ Le pétiole a des rides régulièrement disposées en arc d'un côté à l'autre, en passant par la face postérieure où elles sont transversales. (longitudinales de côté). Le dessus est comme le postpétiole grossièrement ridé rugueux en long. Les rides de la tête n'ont nulle tendance à l'allongement. (D'après un cotyple reçu de Mr. FOREL).

121. — *Cataulacus lujae* FOR. v. *weissi* SANTS.

♀ Cette variété diffère du type par la sculpture de la tête formée d'un réticule de rides plus espacées et plus faibles. Celles du thorax plus distinctement longitudinales bien qu'aussi souvent anastomosées.