

Pétiole comme chez *lujae*. La tête et le gastre sont légèrement plus allongés.

122. — *Cataulacus traegaordhi* SANTS.

Congo belge : Kai Bumba ♂ et Ganda Sundi ♀, (Dr. SGHOUTEDEN) — Stanleyville à Kilo (L. BURGEON) ♀. Les ♀ diffèrent à peine du type par les mandibules moins striées (comme chez la var. *ugandensis*) et les stries de la base du gastre légèrement plus accusées.

123. — *Cataulacus traegaordhi* SANTS. v. *ugandensis* SANTS.

♀ Cette variété diffère du type de l'espèce par les rides du milieu de la tête qui sont plus faibles et forment des mailles plus larges.

Congo belge : Banana, — Kwamouth, — Bolobo, — Kisantu, — Mongende, — Lukula (Dr. H. SCHOUTEDEN); — Congo da Lemba (MAYNÉ).

124. — *Cataulacus jeanneli* SANTS. v. *aethiops* n. var.

♀ Long : 3,3-3,5 mm. Diffère du type par sa taille plus forte, les côtés de la tête derrière les yeux plus fortement crénelés. Le pronotum un peu plus large.

Congo belge : Kidada-Kitobola (H. SCHOUTEDEN) et Barumbu (BEQUAERT).

Cette espèce est voisine de *C. traegaordhi* SANTS.; elle en diffère par la sculpture dont le fond est densément réticulé-ponctué. Un réseau de rides sans directions définies (sauf vers l'épistome) s'étend sur la tête comme chez *C. lujae* FOR. tandis qu'il n'y a de réseau sur le thorax que vers le devant du pronotum. Le reste est ridé en long comme chez *C. traegaordhi* mais avec des rides moins grosses. Le gastre réticulé ponctué n'a que de faibles rides à la base. La tête est très allongée et ses mandibules presque lisses en font une espèce distincte. (Dans la description originale, *Voyage ALLUAUD et JEANNEL, Formicidae* 1914, p. 109, la figure est assez exacte pour les contours, mais la sculpture y est incomplète).