

125. — *Cataulacus degener* SANTS.

Cette forme est bien spécifiquement distincte par ses grands yeux qui atteignent l'angle postérieur de la tête et à partir desquels le bord postérieur est fortement convexe, sans crénelures.

126. — *Cataulacus elongatus* n. sp.

♂ Long : 4,2 mm. Largeur de la tête 1 mm. — Noir. Scapes, palpes, tibias jaune roussâtres. Bouc du funicule et tarses rougeâtres. Submat. Tête ridée réticulée à grosses mailles et sans direction nette. Le fond est finement et irrégulièrement réticulé et un peu luisant. Les rides sont cependant longitudinales sous et sur les côtés de la tête en dehors des yeux. Le dessus du thorax est assez fortement et régulièrement ridé en long avec des anastomoses très clairsemées, sauf sur le devant du pronotum qui est aussi réticulé que la tête. Les côtés du pronotum, de l'épinotum et du pétiote sont très obliquement ridés de bas en haut et en arrière. Des rides semblables s'étendent sur la mésopleure en divergeant à partir de son bord antérieur. Dessus du pétiote strié-ridé en arc à concavité antérieure. Postpétiote grossièrement rugueux. Le gastre est densément ponctué réticulé avec des rides assez fines, longitudinales mais assez serrées et irrégulièrement anastomosées. Cuisses ridées. Tibias lisses. Pilosité fine, pointue, assez longue et abondante, comme chez *C. pilosus* SANTS., sur le corps et les appendices, plus courte et tronquée vers la bouche. Tête environ d'un cinquième plus longue que large, médiocrement rétrécie devant, le bord postérieur droit, avec les angles à peine obtus et garnis de deux denticules. Les yeux sont grands, leur diamètre plus du double que l'intervalle qui les sépare du bord postérieur de la tête. Crêtes frontales un peu sinueuses, leur dent pré-oculaire assez éloignée de l'œil. Epistome mal limité derrière, assez convexe au milieu et échancré au centre de son bord antérieur. Mandibules lisses avec de gros points pilifères, leur bord terminal inerme et droit. Thorax au moins deux fois plus long que large devant, où il est convexe. Sutures peu marquées. Côtés du pronotum bordés, parallèles, faiblement et éparsément denticulés, les angles antérieurs dentés. Mésonotum et épinotum non bordés. Epines épinotales larges à leur base, longues comme la moitié de leur intervalle. Celui-ci arqué. Face