

déclive concave de haut en bas et finement strié en travers. Le pétiole plus long que large, réticulé derrière, a une face supérieure un peu convexe sur le profil et non bordée latéralement puis une face antérieure verticale. Postpétiole un peu plus large que le pétiole, un tiers plus large et deux fois plus haut que long; le dessus et les côtés arrondis. Gastre environ deux tiers plus longs que large, échancré devant, à bords mousses.

Loanga (par LE MOULT).

CLÉ ANALYTIQUE DES VARIÉTÉS DE *POLYRHACHIS MILITARIS* F. ♀.

1. Côtés de la tête se rétrécissant directement derrière les yeux.
P. militaris st. *epinotalis* FOR.
- Côtés de la tête se prolongeant derrière les yeux pour former un angle postérieur distinct (*P. militaris* F.). . . . 2
2. Abdomen non strié 4
- Abdomen strié ou fortement ridé 3
3. Stries du gastre longitudinales st. *striativentris* EM.
- Stries ou rides transversales sur le gastre. v. *transversaria* FOR.
4. Dents de l'épinotum courtes, moins de 2 fois plus longues qu'épaisses à la base 5
- Dents de l'épinotum deux fois plus longues qu'épaisses à la base, et recourbées en avant *militaris* v. *nkomoensis* FOR.
- 5 Pubescence grise ou blanchâtre, au moins sur le dos du thorax . 6
- Pubescence dorée ou cuivrée, au moins sur le dos du thorax . 8
- 6 Pubescence du gastre assez faible et grisâtre 7
- Pubescence du gastre argentée à la base comme le thorax, et dorée en arrière . . *cupreopubescentis* FOR. v. *dido* WHEELER (-*argentea* STITZ).
7. Tête et thorax plus faiblement striés, plutôt rugueux-ridé, côtés de la tête plus arqués (10-12 mm.) *P. militaris* F.
- Tête et thorax assez fortement striés en long, côtés de la tête plus droits. *militaris* F. v. *sibangensis* FOR.
8. Plus svelte, les yeux très bombés, épines épinotales plus longues, stries de la tête et du thorax plus accusées 9