

- Plus robuste. Yeux moyennement convexes, et plus larges, épines épinotales pas plus longues que l'intervalle de leur base. (plus courtes que la moitié de cet intervalle chez la ♀) . . . . . 11

9. Pubescence dense et uniformément cuivrée partout.

*P. militaris* F. st. *cupreopubescens* FOR.

- Pubescence non entièrement cuivrée partout . . . . . 10

10. Pubescence cuivrée ou dorée sur le thorax et le gastre, grise ou argentée sur les côtés du thorax.

*cupreopubescens* FOR. v. *pleurata* SANTS.

- Tête et thorax dorés, pubescence du gastre assez dense et grisâtre. . . . . *cupreopubescens* FOR. v. *calabarica* FOR.

11. Tête et gastre avec une pubescence abondante

*P. militaris* st. *bruta* SANTS.

- Gastre à peine pubescent et assez luisant.

st. *bruta* SANTS. v. *sankisiana* FOR.

127. — **Polyrhachis (Myrma) militaris** F. st. *cupreopubescens* FOR. var. *pleurata* n. var.

♀ Pubescence du dos du thorax et du gastre d'un jaune cuivreux ou doré, celle des côtés du thorax grise ou argentée (aussi cuivrée sur les côtés que dessus chez *cupreopubescens* FOR.). La tête est aussi striée que chez *sibangensis* FOR., pour le reste comme chez *cupreopubescens*. Ressemble par sa couleur à la race *bruta* SANTS. Mais elle est moins robuste et ses yeux sont distinctement plus convexes.

Congo belge : Yambata (DI GIORGI) types; — Kasai, Kondué (LUJA); — Kunungu, — Mongende (Dr. H. SCHOUTEDEN). — Betou, Labage (Dr. REICENBACH).

Cameroun : Molundu, (Dr. REICHENSBERGER).

128. — **Polyrhachis (Myrma) militaris** F. st. *bruta* SANTS.

♀ (Non décrite). Long : 12-12,5 mm. Comme chez *militaris* F, mais un peu plus robuste. Les stries de la tête moins apparentes que chez les var. de *cupreopubescens* FOR. Les yeux sont un peu plus grands et un peu convexes, nullement bombés comme chez les autres variétés. La pubescence dorée abonde sur le dos du thorax et le gastre, elle est grisâtre sur les côtés du thorax. Epines supérieures de l'écaille