

Hoa-Chan, comme Chemo.

Lou-Bou, dans les montagnes, près de I-Hing (sud du Kiang-Sou).

Nan-King (alias: Nan-Kin), capitale du Kiang-Sou.

Ning-Kouo-Fou, dans le Ngan-Hoei.

Sia-Shu (alias: Hia-Chou), près de Tchen-Kiang (Kiang-Sou).

Tchen-Kiang (alias: Chinkiang), province Kiang-Sou.

Tsang-Wang-Tsen, vers le sud de la province de Ngan-Hoei.

Yué-Wan-Kiai, vers le sud de la province du Ngan-Hoei.

Zi-Ka-Wei (alias: Siccawei), avoisine Chang-Hai (alias: Shang-hai).

Zo-Cé (alias: Zo-Sé), colline près de Chang-Hai).

Seules provinces représentées: Kiang-Sou (alias: Kiang-Su) et le Ngan-Hoei (alias: Anwei).

Soochow, cité souvent par Weeler (alias: Sou-Tcheou, Sou-Tsé), est au Kiang-Sou, entre Chang-Hai et Nan-King.

Les espèces parachinoises ici citées ou décrites sont précédées d'un astérisque. Toutes celles qui ne portent pas une indication spéciale proviennent des envois du R. P. O. Piel.

Le total des formes ici citées s'élève à 35, dont 6 sont nouvelles. Parmi ces 35 formes, 15 se rattachent nettement à la faune paléarctique, 8 sont locales ou indifférentes, et 12 se rapportent à Formose ou à l'Indomalaisie.

1. **Euponera (Brachyponera) solitaria** Sm.

Nan king, 1 ♀. Nouvelle pour la Chine.

2. **Euponera (Brachyponera) nigrita** Em. st. **chinensis** Em.

Tchen kiang, — Zi-Ka-Wei, — Zo-Cé. ♀ ♀.

3. **Ectomomyrmex japonicus** Em.

Zo-Cé. 1 ♂. Nouvelle pour le continent chinois, mais décrite sur un exemplaire de l'île voisine de Tsushima.

4. **Ectomomyrmex horni** Forel.

Zi-Ka-Wei, 1 ♀, connue jusqu'ici de Formose.

5. **Odontomachus monticola** Emery st. **formosæ** Forel.

Zo-Cé.

Cette forme a la sculpture du thorax beaucoup moins grossière que chez le type *monticola*. Les stries du pronotum ont une direction plus nettement transversale et qui rappelle celles de *O. ruficeps* Sm. Les exemplaires de Zo-Cé sont légèrement plus grands que le type de Formose, mais moins que chez la var. *major* Forel.