

6. **Aphaenogaster geei** Weeler.

Zi-Ka-Wei. nombreuses ♀. Cette belle espèce a été décrite sur des exemplaires de Sou-Tchou (alias Soo-Chow), également dans la province du Kiang-Sou.

7. **Messor lobulifer** Emery.

Zi-Ka-Wei, ♀, ♀, ♂, Tchen-Kiang. S'étend jusqu'en Mongolie.

8. **Pheidole rhomboida** Mayr.

Zo-Cé, Zi-Ka-Wei. ♂, ♀, Ning-Po (Reichensperger).

*rhomboida* Mayr.  
*mit Reichensperger*  
 1924/25

9. **Pheidole teneriffana** Forel.

Cette espèce se fait de plus en plus cosmopolite. Décrite sur des exemplaires des Canaries, elle a été successivement rencontrée à Sousse (Tunisie), Smyrne, Kartum, Mombassa, Durban, aux îles Samoa et maintenant en Chine. Sa patrie d'origine paraît être le Soudan ou le Haut-Nil.

10. **Pheidole noggii** Forel var. **zoceana** nov. var.

♂ Long: 3 mm. Jaune roussâtre testacé. Antennes, pattes et gastre jaunâtre. Une tâche brune, floue, transversale, sur ce dernier. Bord antérieur de la tête d'un brun rougeâtre. Finement réticulée ponctuée avec de grosses rides longitudinales sur le devant de la tête et devenant de grosses mailles dans sa moitié postérieure. Mésopleure, côtés de l'épinotum assez densément réticulé ponctué. Gouttière de l'épinotum plus ou moins réticulée striolée en travers. Gastre lisse avec sa base légèrement réticulée et un peu moins luisante que le reste. Pilosité aussi longue et un peu plus abondante que chez la race *maxwellensis* Forel. Epines de l'épinotum comme chez cette dernière et chez la race *sauteri* Forel, plus courtes que chez le type *noggii*, le reste se rapporte à la description de cette dernière forme.

♀. Les épines épinotales plus courtes que chez le type, comme chez *maxwellensis*, le postpétiolo aussi long que large. Pour le reste, comme chez le type avec la base du gastre lisse.

Zo-cé — 19, VII, 1924, sur un cadavre de cigale (R. P. O. Piel).

11. **Pheidole pieli** n. sp.

♂ Long: 2,8 à 3 mm. D'un jaune roussâtre, la tête plus rousse avec son bord antérieur et celui des mandibules rouge brunâtre. Gastre et postpétiolo d'un jaune brunâtre le dessus du premier maculé de brun. Tête ridée en long dans ses deux tiers antérieurs, grossièrement réticulée dans le tiers postérieur.