

Quelques fins trabécules qui s'effacent latéralement pour marquer le lit du scape. Le fond des rides est du reste lisse et luisant. Pronotum espacément, épinothum plus densément ridés en travers. Mésopleure et le reste lisse et luisant. Pilosité dressée fine et assez abondante, plus courte et plus épaisse sur la tête que sur le reste du corps, très fine et assez longue sur les pattes et les scapes. Pubescence rare.

Tête longue de 1,1 mm., large de 0,9 mm. Aussi large derrière que devant avec une incision occipitale assez forte formant des lobes assez régulièrement arrondis. Côtés de la tête faiblement convexes avec les yeux près du quart antérieur. Arêtes frontales prolongées par une ride qui limite en dedant un très léger scrobe. Le sillon occipital s'efface vers le milieu de la tête, assez élargi et impressionné au vertex. Aire frontale imprimée, mal limitée devant. Epistome lisse au centre, ridé sur les côtés, faiblement convexe avec le bord antérieur échancré. Mandibules larges et fortement convexes au bord externe, lisses avec quelques points épars et quelques stries à la base. Le scape atteint à peine le milieu de sa base à l'angle postérieur de la tête. Articles 2 à 8 du funicule aussi larges ou à peine plus larges que longs. Avant-dernier article de l'antenne pas tout à fait trois fois plus court que le dernier. Promésonotum globuleux, légèrement élargi en cône très court. Suture promésonotale peu distincte. Un très léger bourrelet subdenté latéralement traverse le mésonotum. Incisure métanotale profonde. Face basale de l'épinothum carrée, plane, les côtés peu bordés. Épines courtes, un peu plus longues que larges à leur base, un peu moins longues que le tiers de la face basale, réunies par une ride plus accentuée qui sépare les deux faces. La déclive est un peu concave de haut en bas et aussi longue, de profil, que la précédente. Pédicule du pétiole inerme dessous, un peu plus épais et plus long que le nœud, lequel, vu de derrière, paraît rectangulaire, un peu plus large que haut, le sommet entier et les angles mousses. Postpétiole le double plus large que long et que le pétiole, un tiers plus long que haut avec les côtés coniques et pointus.

♂ Long: 1,6 à 1,8 mm. D'un jaune roussâtre plus clair et plus uniforme que chez le ♀. Gstre jaune brunâtre avec une large bande brune, floue, en travers du milieu. Quelques rides longitudinales sur les joues et transversales sur l'épinothum; tout le reste lisse et luisant avec quelques points épars.