

haut (bien moins haut que chez *M. carbonarium* et bien moins fortement étranglé au thorax). Très luisant, taille et le reste comme chez le type.

Zo-Cé.

18. ***Monomorium nipponensis*** Wheeler.

Zo-cé. Connu jusqu'ici que du Japon. ♂

19. ***Monomorium pieli*** n. sp.

♂. Long: 1,6 à 1,8 mm. Jaune. Gstre noir sauf le dessous vers la base qui est jaunâtre. Lisse et luisant. Pilosité dressée très fine, assez longue et moyennement abondante. Pubescence oblique assez riche sur les scapes, plus espacée sur les pattes, presque nulle sur le corps.

Tête d'un quart environ plus longue que large, aussi large devant que derrière, les côtés un peu convexes surtout derrière les yeux, le bord postérieur un peu concave avec les angles brièvement arrondis. Les yeux sont un peu plus petits que l'espace qui les sépare du bord antérieur de la tête, presque aussi grands que le cinquième de ses côtés et placés entre leur milieu et leur tiers antérieur. Crêtes frontales plus écartées que leur prolongement derrière les fossettes antennaires, lequel est un peu divergent et souvent brunâtre. Epistome convexe, à carènes très mousses et bord antérieur mutique. Mandibules d'au moins 3 dents. Le scape atteint presque le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 7 du funicule un tiers plus épais que longs, le 9 plus mince que le 10, tous deux à peine plus longs que larges au bout. Le dernier de la massue aussi long que l'ensemble des quatre précédents. Le thorax est un peu plus allongé que chez *M. minutum* Mayr et bien plus étroit que la tête. Le promésonotum a sa suture obsolète, il forme sur le profil une convexité assez accentuée et régulière du col au fond de l'échancrure métanotale. Celle-ci est plus profonde et plus évasée que chez *M. minutum*. L'épinotum dessine une convexité régulière plus basse et d'environ deux cinquièmes plus courte que la précédente. La face basale courte passe souvent sans limite précise à la déclive. Pédicule du pétiole long comme la moitié de la base du nœud. Celui-ci, un peu plus long que haut, a le sommet mousse et ses faces antérieures et postérieures subégales. Le dessous du nœud n'est presque pas convexe. Postpétiole d'un tiers plus large que long, un peu plus large et d'un tiers plus bas que le précédent. Gstre échancré à la base.