

33. **Polyrhachis (Myrma) pyrgops** Viehmeyer.
La petite dent médiane de l'écaïlle n'est pas constante.
Lou-Bou, Tchen-Kiang, Tsang-Wang-Tsen, Yue-Wan-Kiai,
♀ ♂.
34. **Polyrhachis (Polyrhachis) lamellidens** Sm.
Kiang-Sou, Lou-Bou, Yue-Wan-Kiai. ♂
Espèce connue d'abord du Japon.
35. **Polyrhachis (Myrmopla) hippomanes** Smith v. **moesta**
Emery.
Zi-Ka-Wei, 1 ♂.

APPENDICE I

*Quelques nouvelles variétés indomalaises.***Crematogaster (Paracrema) modiglianii** Em. v. **surbeki** n. var.

♂. Long: 3,3 mm. environ. Noirâtre, le gastre presque aussi foncé que le thorax. Les côtés de celui-ci, la face déclive de l'épinothum et le dessous de la tête d'un brun rougeâtre plus foncé que les mandibules. Funicule et tarsi roussâtres. Diffère en outre du type par l'absence de rides sur le thorax qui est entièrement et régulièrement réticulé ponctué, mat ou submat. Sur la face occipitale, les côtés du pronotum et la face postérieure du postpétiole, cette réticulation est presque effacée et luisante. Les rides de la tête ne dépassent pas son tiers postérieur. Le postpétiole n'est qu'un peu imprimé derrière.

Ressemble à la var. *picata* Viehmeyer, mais celle-ci est plus lisse et luisante que chez *taipingensis* Forel, c'est le contraire chez la var. *surbeki*.

Sumatra: Labouan Bilik (Dr V. Surbek). Plusieurs ♂ dans un nid d'*Eutermes*.

Crematogaster (Paracrema) modiglianii Em. v. **anamita** (Forel).

Forel: 1903, « Journal Bombay Nat. Hist. Soc. XIV », p. 690.
— 1910, « The Philippine Journ. of. Sc. », p. 125. — 1911, « Rev. Suisse Zool. IXX », p. 25.)

J'ai reçu autrefois de M. Forel deux variétés du *Cr. modiglianii* Em. l'une étiquetée var. *anamita* Emery et l'autre var. *anaemica* Em. Ni l'une ni l'autre ne paraissent avoir été décrites par M. Emery et ne figurent pas dans son catalogue des *Myrmicinae* du Genera Insectorum. Mais M. Forel désigne