

pendices brun rougeâtre. La pubescence est plus abondante et la sculpture un peu plus forte que chez le type. Celui-ci est plus petit, le devant de la tête (clypeus et joues) rougeâtre. Pour le reste semblable.

Cambodge, province de Taki ♂, Phum Kanteng. Reçu de l'Institut scientifique de l'Indochine avec la mention: « Fourmis enlevant les cochenilles à laque lors de l'ensemencement sur l'arbre « Sankei ». Septembre 1924.

Dolichoderus (Hypoclinea) bituberculatus Mayr. v. **bilikana** n. var.

♂ Long: 3,8 mm. Noire. Bord des mandibules, condyle du scape rouge sombre. Tarses jaune brunâtre. Reste des appendices brun noirâtre ou noir brunâtre. Tête finement ponctuée, mais assez luisante et, comme le thorax, moins grossièrement sculptée que chez le type. La pubescence est fine et aussi abondante. Pour le reste comme chez le type.

Sumatra, Labuan Bilik (Dr V. Surbek).

Dolichoderus (Hypoclinea) cuspidatus Em. st. **surbeki** n. st.

♂ Long: 5,5 mm. à 6 mm. Intermédiaire entre *cuspidatus* et *furcifer* Em. D'un rouge brunâtre assez clair passant au brun rougeâtre foncé sur le dos du thorax, la moitié distale du scape, le milieu du funicule moins ses deux articles externes, les genoux, tibias et premiers tarses. Le gastre et les épines du mésonotum noir brunâtre, leurs pointes rougeâtres. Hanches, le reste des fémurs, petits tarses base du gastre et l'écaille d'un rouge plus roussâtre. La tête est assez luisante et finement réticulée. Thorax finement et densément ponctué, mat, avec quelques rides discrètes sur le pronotum, beaucoup plus grossières sur le reste du thorax. Gastre très pubescent avec quelques poils courts au bout.

Tête presque aussi large que longue, moins fortement échan-crée derrière que chez *cuspidatus*. Disque du pronotum un peu plus concave, relevé vers son bord antérieur circulaire. Épines mésonotales aussi fortes et divergentes que chez *furcifer*. Méta-notum plus élevé que chez *cuspidatus*, ses épines plus grandes, assez dilatées à la pointe. Echan-crure de l'écaille large, peu concave entre les épines qui la bordent.

Sumatra, N. O. Labuan Bilik (Dr V. Surbek). Nombreuses ♀.

Polyrhachis (Polyrhachis) bihamata Drury v. **perplexa** n. v.