

Les yeux un peu plus grands. Sillon frontal indiqué par la convergence de la pubescence qui s'y relève. Une légère impression allongée près du bord antérieur de l'épistome qui est faiblement échancré en arc. Les deux dents apicales des mandibules fortes. Le scape dépasse de près d'un quart le bord postérieur de la tête. La face basale de l'épinotum est presque sur le même plan que le scutellum (plus bas chez *erraticum*).

♂ Long: 4,2 mm. Brun jaunâtre assez foncé, les appendices plus clairs. Submat en raison de la forte pubescence. Tête plus large que longue (un peu plus large que chez *tauridis* Em. avec les mêmes contours). Epistome échancré comme chez la ♀, avec les yeux assez grands. Lame subgénitale aussi largement échancrée que chez *nigerrimum*, avec ses lobes en triangle. Angles inférieurs de la squamula en lobe arrondis. Le stipe est assez étroit et subaccuminé. Volselles étroites et coudées en dedans. Sagittæ et lacinies biaccuminées.

♀ La tête est aussi allongée que chez les petites ♀ de *erraticum* avec les yeux plus grands que chez le tiers des côtés. Le profil du thorax est moins sinueux que chez les grandes ouvrières, la face basale de l'épinotum moins élevé.

Pékin: 3 ♀, 1 ♀, 2 ♂. — Shanghai Kwan: 1 ♀ (S. Folchini).

Plagiolepis manczshurica Ruzsky.

Syn: *P. pygmaea* v. *manczshurica* Ruzsky 1905, Formic. Imp. Ross, p. 467. — Emery: 1921, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 314. — 1925, Cat. Gen. Insect. Formicinæ, p. 21.

Cette forme correspond très bien à la description de Ruzsky, mais comme celui-ci ne donne pas la formule antennaire, elle pouvait passer pour une var. de *pygmaea*, tandis qu'en réalité c'est une espèce distincte. Les articles 3 et 4 du funicule sont subégaux et bien plus longs que le deuxième. Le premier est très long.

Chine: Pékin (S. Folchini).

Formica (Serviformica) rufibarbis Nyl. v. **glabridorsis** n. v.

♀ Taille, coloration et pubescence comme chez la var. *sinnense* Em. (— *orientalis* Wheeler), mais distincte de celle-ci par l'absence de pilosité dressée sur le thorax. La tête est plus courte, les côtés plus arqués (faiblement) et moins convergents et les yeux plus convexes que chez *rufibarbis*. Diffère de la var. *glauca* Ruzs. dont elle a la pilosité, par ses taches du