

Les yeux occupent environ le deuxième quart antérieur des côtés. Un sillon frontal, incomplet, atteint l'ocelle médian. Le scape atteint le quart postérieur de la tête. Scutellum sur le même plan horizontal que le mésonotum, et recouvrant un court métanotum. Les deux faces de l'épinotum sont également longues et concaves de chaque côté des épines. L'intervalle basal de celles-ci est aussi concave. Le pétiole a un pédicule denté dessous vers la base, son noeud a sa face postérieure verticale, l'antérieure un peu oblique, il est plus haut que le postpétiole et aussi large que l'épinotum. Le postpétiole est d'un quart plus large et deux fois plus épais que le pétiole. Le dessous denté.

Argentine. Cordoba, Alta Gracia (C. Bruch) Plusieurs ♀ trouvées dans un nid de *Pheidole obtusopilosa* Mayr. Ce nouveau genre rappelle les *Solenopsis* par son épistome et *Pheidole* par d'autres caractères. Il diffère du genre parasite *Epoecus* Em. par son aspect plus trapu, les antennes surtout et par son épinotum denté.

Quels sont les rapports de cette espèce avec son hôte? L'absence d'ouvrière fait supposer des moeurs voisines de celles d'*Anergates*, *Wheelwrightella* etc. La présence de femelles ailées *Pheidole* ne parle pas absolument pour la présence de la reine hôte dans le nid, ces femelles pouvant provenir d'un couvain pondu antérieurement à l'invasion du parasite.

Pheidole obtusopilosa Mayr.

♀ (non décrite). Long: 5,5 à 6,5 mm. Vertex, dessus du mésonotum et du scutum brun foncé, ces derniers lisses et luisants avec des points épars. Le reste coloré et sculpté comme chez le soldat.

Tête trapézoïdale, aussi longue qu'étroite devant, le bord postérieur large et droit, les côtés un peu convexes derrière les yeux qui en occupent environ le deuxième quart antérieur. Le scape atteint le quart postérieur de la tête. Une ride médiane plus forte que les voisines sur l'épistome. Mandibules lisses avec des points épars. Face antérieure et convexe du mésonotum aussi haute que le pronotum qu'elle surplombe un peu. Epinotum épineux, la face déclive deux fois plus longue que la basale. Pétiole plus large que chez le soldat. Ailes faiblement jaunâtres à nervures jaune brunnâtre.

Alta Gracia. ♀ ♂ ♀ 2 donnat. asile à *Oxyepoecus bruchi* Sants. (C. Bruch leg.)

Pseudoatta argentina Gal. v. *platensis* n. var.

♀, Long: 6,5 mm. Les épines occipitales et pronotales plus longues

♂ Long: 5,4 mm. Le pétiole est distinctement plus haut et plus court que chez le type. Ailes supérieures longues de 5,5 mm. Du reste comme chez le type.

La Plata (C. Bruch leg.) ♂ ♀ dans un nid de *Acromyrmex lundi* Guer. v. *bonnariensis* Em.

Gallardo a décrit ce genre sur des exemplaires de diverses localités. C'est celui de Misiones, décrit et figuré en premier qui doit être considéré comme type. Il a été capturé avec *Acromyrmex balzani* Em.