

*Messor barbarus* L. st. *meridionalis* André (= *M. barbarus* L. st. *mediorubra* For. v. *sublaeviceps* Sants.)

Cette variété ne diffère pas du type de *meridionalis* André, dont la tête et le gastre sont noirs ou noir brunâtre avec le thorax plus ou moins rouge.

Tunisie : Tunis, Kairouan, Hammamet.

Algérie : Birin, Kabylie.

Italie : Naples.

*Messor barbarus* L. st. *meridionalis* André v. *grandinida* Sants.

C'est une petite variété de *meridionalis* qui s'en distingue par sa tête et son thorax monochromes, généralement d'un brun foncé. La tête est relativement plus grande et fait passage à la variété suivante. Quant à la femelle, elle a une tête plus allongée que chez *meridionalis*.

Tunisie : Kairouan.

*Messor barbarus* L. st. *meridionalis* André v. *Wasmanni* Krause.

Corse : Sagone (Dehaut); Tunis.

*Messor barbarus* L. st. *meridionalis* André v. *marocana* Em.

Outre la sculpture très lisse et luisante de la tête, le pronotum est beaucoup plus faiblement sculpté que chez les autres variétés de la race.

Je l'ai reçue de différentes localités du Maroc et d'Algérie : Hodna.

*Messor barbarus* L. st. *postpetiolatus* n. st. (fig. 1) Ouvrière long, 3,5-7 mm. (il existe peut être des exemplaires plus grands). Tête, scape, cuisses et gastre noir brunâtre. Thorax, mandibules et reste des appendices rouge-sombre. Tarses roux. Tête lisse et luisante avec quelques stries de chaque côté du front. Epinotum transversalement ridé ponctué. Devant du pétiole post-pétiole et gastre lisses. Pilosité un peu plus abondante que chez *meridionalis*, mais moins que chez *barbarus* i. sp. Psammophores bien développés. Tête des grandes ♀ un peu plus étroite devant ; le scape atteint le bord occipital. Epinotum inerme ou subdenté chez les ♀ de 7 mm ; la face basale un peu convexe sur le profil. Sommet du pédicule échancré. Post-pétiole subsphérique, plus large que long ; vu de dessus, il paraît aussi grand que l'épinotum chez les ♀ (7 mm) relativement plus petit chez les ♀' ♀". Gastre arrondi.

Kairouan, 3 ouvrières.

Très caractéristique par son post-pétiole beaucoup plus grand que chez les autres races du *barbarus* à l'exception de *latinoda* n. st.