



Fig. 1. *Messor barbarus* L. st. *postpetiolatus* n. st. Postpétiole vu de dessus et de côté.

*Messor barbarus* L. st. *structor* Latr. v. *romana* n. var. Taille de la var. *tyrrhena* Em., légèrement plus élancée, mais d'un beau noir y compris les scapes, les joues et les cuisses. Mandibules funicule et reste des pattes d'un rouge foncé, le thorax des ♂ est souvent plus clair. La ♀ a les ailes hyalines comme chez la var. *mutica* et la couleur comme chez ♂. Sculpture plus faible derrière les yeux que chez *mutica*.

Chez la var. *orientalis*, la ♀ a les ailes enfumées et les antennes brunes, la taille plus grande tandis qu'elle est au contraire plus petite chez *tyrrhena* Em. ♀.

Roumanie : Bucarest (Montandon Leg.)

var. *Alexandri* n. var.

Ouvrière long 6-11 mm. D'un beau rouge foncé. Tête, mandibules et souvent le devant du thorax d'un rouge brunâtre clair avec une tache floue, brunâtre sur les arêtes frontales. Gstre, scape et partie des pattes brun noir. Funicule, reste des pattes et parfois la base du gstre d'un roux plus ou moins brunâtre. Sculpture comme chez la v. *mutica*. La tête de l'ouvrière major atteint 3,2 mm de long sur 3,4 mm de large avec l'épinothum subdenté chez l'ouvrière et même denticulé chez l'ouvrière minor. Le mésonothum est un peu moins convexe que chez *mutica* ; pour le reste comme chez cette variété.

Syrie : Alexandrette. (Dr Geade leg.)

*Messor barbarus* L. st. *semirufus* André var. *maculifrons* n. var.

♂ long. 5-10 mm. Varie du brun rouge au rouge brunâtre. Bord des mandibules, parfois de l'épistome, une grande tache sur le vertex, une autre moins marquée aux angles postérieurs de la tête et sur le mésonothum, hanches, milieu des cuisses et gstre brunâtres. Antennes et reste des pattes d'un roux brunâtre clair. Sculpture et pilosité de *semirufus* type, sans stries dans les fossettes antennaires. Le mésonothum