

Baguirmi. Techeckna (Chari-Tchad) et Harrar (Muséum de Paris) confondue avec la v. *galla*) Sénégal : Casamance (Clavaux) Choa. Emery.

*Messor barbarus* L. st. *latinoda* n. st. (fig. 2) Long. 4-12 mm. Taille et couleur: rouge de la race *galla* Em. Epinotum plus foncé, gastre brun. La tête est d'un rouge d'autant plus clair que l'individu est plus grand, c'est le contraire pour la couleur des mandibules. Pattes et antennes brun rougeâtre, plus diluée à l'extrémité. Tête luisante, avec une fine ponctuation clairsemée. Un faisceau de stries frontales atteint chez le ♂, le bord occipital. Ces stries sont à peine marquées chez les ouvrières. Aire frontale, épistome et mandibules grossièrement striées. Ces dernières sont en outre fortement ponctuées. Une impression frontale peu ou pas distincte, pas d'impressions latérales. Thorax transversalement strié ridé dessus, plus ou moins obliquement sur les côtés. Le dessus du mésonotum des ♂ plus luisant et plus faiblement sculpté. Pédicule finement rugueux. Gastre lisse. Pilosité jaunâtre très clairsemée. Macrochètes formant un psammophore assez développé.

Tête du ♂ en rectangle transversal (3×3,7 mm) les côtés faiblement convexe le bord postérieur un peu concave. (Chez l'ouvrière la tête est




Fig. 2. *Messor barbarus* L.

1. st. *galla* Em. ♂ : Postpétiole vu de dessus.
2. v. *latinoda* Santschi ♂ : Pétiole vu de derrière

aussi large que longue et plus longue que large chez ♀. Les yeux sont bien plus grands que chez *barbarus* L. Mandibules un peu plus larges que chez *barbarus*. Profil du promésonotum assez régulièrement arrondi, plus convexe que chez *barbarus*, descendant derrière plus près de la suture épinothale. Epinotum bordé, cubique, la face basale un peu convexe,