

[15 Feb. 1918]

- 31 -

fleurs assez compactes, mais plutôt étroites, glanduleuses, avec très peu de poils. La seconde au contraire, présentait des inflorescences très denses, épaisses, presque cylindriques et très velues. Le fait que ces deux formes habitaient le même endroit (une carrière située au-dessus de la voie ferrée, un peu avant d'arriver à Mostaganem, venant de Mazagan), exclut toute influence de milieu sur la constitution de la plante. Je supposais me trouver en présence de deux variétés nouvelles et j'en avais exprimé l'idée à M. le professeur BATTANDIER; mais celui-ci ayant alors attiré mon attention sur une forme décrite par M. MURBECK (Contributions, fasc. I. p. 58 - var. *brevipila*), j'ai pu reconnaître que la forme glabre de Mostaganem était presque identique et pouvait parfaitement s'y rapporter, ayant, comme elle, les divisions du calice plus larges que dans le type, glanduleuses ainsi que les feuilles florales, et était à peu près complètement dépourvue de poils. Mostaganem est donc une nouvelle station de la variété *brevipila* de Murbeck.

La seconde forme mostaganémoise, elle reste distincte avec les caractères ci-après :

O. *Cherleri* var. *compacta* var. nova. Herba villosissima, inflorescentiis brevibus, crassis, compactis, fere cylindricis.

Leptothorax nouveaux de l'Afrique mineure

par le Dr SANTSCHI *

Leptothorax (*Temnothorax*) *hadrumetensis* n. sp.

♂. Long: 2,5 mill. Jaune fauve; tête et base du gastre d'un jaune plus roussâtre; les deux tiers postérieurs du premier segment du gastre noir brunâtre; occiput un peu brunâtre. Thorax et pédicule assez grossièrement rugueux mais le dessus du promésonotum et des deux nœuds du pédicule reste plus ou moins lisse. Tête et gastre lisses. Pilosité fine, longue et pointue, moins abondante que chez *L. longipilosa* Sants. mais dispersée sur tout le corps et un peu à la base des membres. Pubescence clairsemée, plus sensible sur les appendices.

antennulaire, un tiers plus longue que large, les côtés par-
tels, le bord postérieur à peine convexe avec les angles arrondis et peu
effacés. Les yeux occupent presque tout le tiers médian des côtés de la
tête. Epistome convexe, à bord intérieur très arqué dans ses 2/5 médians.
Le scape atteint presque le bord occipital. Deuxième article du funicule
à peine plus long qu'épais, les suivants aussi épais, ou plus épais que