

longs. Mandibules un peu ridées en long, à 5 dents. Thorax pas beaucoup plus étroit que la tête. Promésonotum assez convexe sur le profil. Un sillon métanotal peu profond. Sans suture. Face basale de l'épinotum (et métanotum soudé) presque le double plus longue que large, à bords plus ou moins discontinus et saillants en dehors dans la partie médiane. n arrière un peu en haut et en dehors, aussi longues que l'intervalle de leur base. Pétiole un quart plus long que haut à peu près, largement tronqué au sommet et aussi large que long.

Dessous du pétiole rectiligne avec une petite dent en avant. Post-pétiole aussi haut que le précédent, mais le double plus large, subtronqué en avant, arrondi en arrière. Gastre allongé.

♀. Long. 3,3 mill. Couleur de l'ouvrière, parfois plus foncée, le milieu du mésonotum et le scutellum rembrunis; pattes claires; les derniers segments du gastre jaune-roussâtre. La tête est un peu moins longue que chez l'ouvrière et le scape atteint juste le bord postérieur. Les yeux occupent plus du tiers médian des côtés de la tête. Les épines de l'épinotum sont presque aussi longues que la face basale et larges à leur base. Pétiole un peu plus long que chez l'ouvrière avec un sommet moins largement tronqué. Métanotum et scutellum lisses. Epinotum rugueux.

Ailes hyalines à nervures pâles longues de 3,2 mill. Le reste comme chez l'ouvrière.

Tunisie: Sousse (l'ancienne Hadrumetum de la Byzacène) (Dr. Normand leg.)

En raison de leur pilosité longue et pointue, les *Leptothorax Foreli*, *arenarius*, *pallidipes*, *tenuispinus*, et *longipilosus* Sants., doivent être classés dans le s. g. *Temnothorax*. Le *Lep. hadr* fait la transition entre le *L. recedens* Nyl. et le *longipilosus*.

*Leptothorax (Temnothorax) recedens* Nyl. ♂ ♀.

Kairouan. — Tout à fait semblable à un exemplaire italien de cette espèce gracieusement communiqué par M. Emery.

*Leptothorax (Temnothorax) miserabilis* n. sp.

♀. Long: 1,8-2 mm. Jaune-brunâtre clair; tête et base du gastre jaune-brunâtre plus foncé; le reste du gastre brunâtre. Mandibules, antennes et pattes plus claires. Lisse et luisant. Côtés du mésoépinotum réticulé. Pilosité dressée, longue, fine et pointue, passablement abondante et présente sur les pattes. Pubescence rare, sauf sur les antennes et les tibias.

Tête un quart plus longue que large, les côtés convexes, le bord