

postérieur peu arqué, les angles bien arrondis. Diamètre des yeux aussi grand que le quart des côtés de la tête et placés un peu en avant de leur milieu. Epistome convexe, lobé dans son tiers moyen. Mandibules submates, striées-pontuées, à 4 ou 5 petites dents. Le scàpe dépasse l'occiput d'un quart de sa longueur. Articles 2 à 7 aussi longs ou à peine aussi longs qu'épais. Thorax beaucoup plus étroit que la tête. Promésotonum convexe, sans sutures. Métanotum distinct, se continuant avec la face basale de l'épinotum sur un plan bordé qui se relève un peu dans la partie antérieure de l'épinotum où il forme aussi une petite saillie latérale. La face déclive, faiblement concave, plus courte que la basale, en est séparée par un petit tubercule ou un denticule. Le post-pétiole est d'environ un tiers plus long que sa hauteur au nœud. Celui-ci, arrondi au sommet et peu élevé. Postpétiole le double plus long que le pétiole. Gastre court.

Tunisie : Le Kef, 1 ouvrière. Cette petite fourmi a un aspect de *Pheidole*.

Leptothorax Rottenbergi Em. st. *Annibalis* Sants. Tunisie Kairouan, Hammamet, Le Kef, Garn el Fayat. (Santschi).

L. Rottenbergi Em. st. *Annibalis* Sants. var. *transitoria* Sants. Tunisie : Le Kef. (D^r Normand).

L. Rottenbergi Em. st. *Annibalis* Sants. var. *littoralis* n. var.

♀. Long. 2,7-3 mm. Plus petit qu'*Annibalis* et avec le thorax un peu moins impressionné. Diffère de la var. *transitoria* par sa tête beaucoup plus allongée, presque mate, avec les rides plus rapprochées sur le front. Épines droites obliquant en haut et en arrière, aussi fines à la base qu'à l'extrémité. Nœud du pétiole arrondi sur le profil, plus étroit que le post-pétiole et plus bas que chez *transitoria*.

Tunisie : Hammamet (Santschi, août 1917), 4 ouvrières ; Souss (D^r Normand) 1 ouvrière.

Leptothorax Rottenbergi Em. st. *scabrosus* Sants.

Le type de cette race provient de Tlemcen (Algérie). Je l'ai retrouvée près d'Aïn-Draham, certains exemplaires atteignent 4,5 mm. Elle diffère de la var. *kabyla* n. v. à côté de laquelle elle se trouve, par son profil thoracique continu.

Leptothorax Rottenbergi Em. st. *scabrosus* Sants. var. *kabyla* n. var.

♀. Long. 3,5 mm. Noir. Pattes et funicule (parfois le thorax) brun-foncé. Sculpture comme chez *scabrosus*, mais le thorax a une impression mésoépinotale distincte, bien que un peu moins prononcée que chez la race *annibalis* Sants. (absente chez *scabrosus*).