

pas de celle du type ; les denticules varient selon la taille de l'insecte.

Ténériffe : Bejano 10 décembre 1911. (Cabrera leg.).

*Leptothorax cabreræ* For. st. *productus* n. st. ♀.

Diffère du type par son pétiote dont le nœud est plus court que son pédicule antérieur (presque aussi long chez le type et plus long chez *mauritanicus* Sants. et *Stitzi*. Pilosité plus courte et plus épaisse, comme chez var. *mauritanicus* et non longue et fine comme chez le type de l'espèce et sa var. *Stitzi*. Profil du thorax régulièrement convexe sans trace d'impression métanotale. Epines déliées courtes comme les 2/3 de l'étroit intervalle de leur base. Sculpture du fond ponctuée comme chez *cabreræ* For. mais avec des rides bien plus fortes sur le thorax, même plus fortes que chez *Stitzi*.

♀. Pilosité plus épaisse et plus courte que chez *cabreræ* ♀ ; le thorax est un peu plus élevé avec une face basale épinotale plus abrupte et les dents un peu plus marquées. Nœud un peu plus élevé, le scape atteint à peine le nœud. Du reste comme *cabreræ* sp.

Maroc : Mogador, reçue de feu Duchaussoy qui l'a probablement obtenue des chasses de feu Vaucher.

*Leptothorax cabreræ* For. st. *productus* Sants. var. *sericeiventris* n. var.

♀. Diffère de *productus* par la sculpture très finement striée réticulée du premier segment du gastre qui est légèrement soyeux et submat. Chez *productus* le gastre est entièrement lisse ou très superficiellement striolé avec un éclat luisant. Chez *L. Bugnioni* For. var. *marocana* Sants. dont on ne connaît encore que la ♀ et le ♂ celle-là a les interrides bien plus grossièrement réticulés et la sculpture du gastre plus forte et plus opaque.

Maroc : Mogador (Duchaussoy leg.).

*Leptothorax angustus* Nyl. var. *algerica* For.

Tunisie : Le Kel, 3 ♀. Dr Normand.

*Leptothorax angustus* Nyl. v. *brunea* Sants.

Tunisie : Aïn-Draham. ♀. (Santschi) Hammamet 4 ♀ (Santschi). Algérie : Alger, 6 ♀. (Seurat) ; 40 ♀, 1 ♀ (Bequaert) ; ces derniers font passage à la var. *algerica* par la longueur des épines qui varie d'un individu à l'autre. Les antennes décolorées dans une tige creuse de rosier.

*Leptothorax angustus* Nyl. st. *Trabuti* For. var. *veneris* n. var.

♀. Couleur comme *Trabuti* mais la massue des antennes brun foncé, les pattes plus claires. La tête surtout est plus étroite et la sculpture moins grossière (mais plus forte que chez *angustus* type). Les rides en avant des yeux convergent en dedans et en arrière et sont bien moins réticu-