

culés. Les épines sont aussi longues que chez *Trabuti* et également incurvées mais plus fines et plus rapprochées de leur base et moins rectilignes sur ce profil.

♀. Long. 3,3^{mm}. Thorax un peu plus foncé que chez l'ouvrière. Mésonotum ridé en long. Epines épinothorales fortes à leur base, un peu moins longues que leur intervalle et dirigées en arrière ; le reste comme l'ouvrière.

Tunisie : Le Kef. Dr Normand.

Leptothorax tuberum L. st. *tebessae* For. var. *gentilis* n. v.

♀. Long 2-2,2 mm. D'un jaune roussâtre, le gastre enfumé de brunâtre, les antennes concolores. Dessus de la tête assez luisant, gastre luisant, reste de la tête, thorax et pédicule assez mats. Thorax rugueux. Tête ridée en long avec les intervalles luisants faiblement réticulés (plus faiblement que chez *L. affinis* et *tuberum*) ; ces rides sont un peu effacées sur le front et plus marquées sur les côtés. Tête bien plus longue que large, les côtés un peu convexes ainsi que le bord postérieur mais les angles fortement arrondis. Profil thoracique rectiligne jusqu'à la base des épines. Celles-ci droites, assez fines à la base, obliques en haut et en dehors, longues comme environ la moitié de l'intervalle de leur base. Pétiole un peu longuement pédiculé devant avec un nœud angulaire à sommet aigu et postpétiole presque aussi large que long.

Chez la race *tebessae* For. la sculpture est bien plus faible, les épines plus courtes, le postpétiole plus étroit, d'un jaune plus clair et le gastre moins machuré. La var. *atoma* For. est plus petite et plus claire, le gastre à peine rembruni.

Tunisie : Aïn Draham, 18 mai 1913.

Leptothorax rusticus n. sp.

♀. Long. 3,3-3,6 mm. Brun foncé, tête et gastre noirs, parfois la base de celui-ci, les pattes et les mandibules, d'un brun un peu plus dilué. Occiput et souvent le front et le vertex lisses et luisants.

Un faisceau de rides longe le dedans des arêtes frontales et s'atténue vers le bord occipital ; un autre faisceau contourne les fosses antennaires ; les côtés de la tête sont grossièrement ridés-réticulés en avant des yeux, plus faiblement entre ceux-ci et les arêtes frontales et beaucoup plus effacées en arrière. Sauf le dos du mésonotum qui est plus ou moins lisse et luisant, le thorax est ridé-réticulé, assez faiblement en avant, très grossièrement en arrière sur la face basale de l'épinothorax. Articles pédiculaires plus faiblement sculptés que le thorax. Gastre lisse et luisant. Pilosité dressée, assez abondante sur l'abdomen, assez longue, tronquée au bout. Pattes et antennes seulement pubescentes.