

Tête rectangulaire, un cinquième plus longue que large. Les côtés subparallèles, à peine convexes, le bord postérieur presque droit. Les yeux, assez convexes sont grands comme presque le quart des côtés de la tête et placés un peu en arrière de leur milieu. Les arêtes frontales très écartées sont prolongées par des rides. Epistome peu convexe, avec une forte ride médiane à côté de laquelle les autres sont effacées sauf le long du bord antérieur qui forme un lobe arqué. Mandibules striées avec un large bord de 5 dents. Le scape dépasse le bord postérieur d'un peu plus de deux fois son épaisseur. Articles 3 à 6 du funicule plus épais que long, 2 et 7 aussi longs qu'épais. Massue épaisse, le dernier article presque aussi long que les deux précédents réunis, qui sont subégaux. Thorax assez fortement étranglé au niveau de la suture mésopinotale, ce qui lui donne l'aspect d'un *Messor*; le promésonotum forme une convexité prononcée sur le profil. L'épinotum est armé de deux courtes dents pas plus longues que le tiers de l'intervalle de leur base. Face basale convexe, plus longue que la déclive qui est concave. Premier nœud pédiculaire arrondi au sommet, plus large que long et bien plus court que le second. Second nœud plus large que long et que le premier nœud. Gastre large, déprimé, tronqué à la base.

Tunisie : Aïn Draham, 18 mai 1913.

J'ai découvert cette espèce sous une pierre; elle paraît voisine du *Leptothorax schauffussi* For., d'Espagne.

*Leptothorax submuticus* Em.

Cette espèce est très voisine du *L. convexus* For. La var. *tímida* Sants. fait passage de l'une à l'autre; elle a le pétiote du *convexus* et le thorax du *submuticus*. La sculpture tient également de l'une et l'autre forme.

*Messor labicornis* For. st. Normandi n. st.

♂. Long 3,8-4,5 mm. Mandibules, funicule et tibias brunâtres, tarses d'un brun plus clair; tout le reste noir. Mat, dessous du corps et côtés du gastre luisants et lisses. Densément ponctué comme le type, y compris le premier segment du gastre (ce dernier est lisse chez le type et ses autres variétés). Tête un peu plus courte, le scape dépasse légèrement l'occiput et la massue est un peu plus épaisse, la face basale relativement plus courte et plus convexe que chez le type. L'épinotum est subdenté comme chez la var. *rugosa* Karaw. Sommet du premier nœud.

♀. Long 8 mm. Dos du thorax lisse et luisant avec quelques points épars, le reste de la sculpture ponctuée avec de fortes rides longitudinales sur la tête et plus faibles sur les côtés du thorax. Epinotum denté, ses deux faces forment un angle presque aussi ouvert que chez *M. barbarus*