

## FOURMIS NOUVELLES DU CONGO

PAR

le Dr F. SANTSCHI

1919 f

**Dorylus moestus** EM. var. **morio** n. var. (= **D. moestus** SANTS.  
Rev. Suisse Zool., 1910, pp. 737 et 741, fig. 4b et 3).

♂. Long. : 20 mm. Diffère du type de l'espèce par sa taille plus petite, les ailes plus courtes, 13 mm. (15 mm. chez le type d'après FOREL), d'un brun plus jaunâtre et plus terne. La tête est un peu plus convexe, plus étroite, moins luisante, les yeux plus petits. Il est moins foncé que la variété *Schereri* FOR., les ailes moins obscures mais de même longueur et la tête un peu moins convexe.

Congo français : Madingou (R. P. ZIMMERMANN).

**Dorylus moestus** EM. var. **claripennis** n. var.

♂. Long. : 20 mm. Brun noirâtre, tête noire. Les ailes, longues de 14 mm., sont hyalines, à peine estompées de jaunâtre, seule la cellule radiale brunâtre, nervures et taches brunes. La pubescence du thorax plus espacée donne un aspect plus luisant. La tête est très luisante, plus convexe et plus étroite que chez le type, les yeux également plus petits (comme chez *morio*). Le funicule légèrement plus mince, son 2<sup>e</sup> article plus court que long, en partie pubescent dessous. Le bord postérieur du pédicule aussi mousse que chez le type, du reste semblable.