

l'aile antérieure, 17 mm. Brun rougeâtre foncé, tête noirâtre, mandibules rougeâtres, antennes et pattes d'un rouge plus sombre. Ailes jaune brunâtre, à cellule radiale rembrunie, à nervures et taches brunes. Mat, finement et densément ponctué, gastre submat et plus espacement ponctué. Dessus du thorax et du gastre pubescent. La tête a de très nombreux poils longs, jaunâtres et dressés. Ceux-ci se retrouvent en bordure de l'épistome, au pédicule, aux hanches et sous le corps; plus courts au bout de l'abdomen.

Tête un peu convexe sur le vertex, les yeux grands comme chez *gaudens*, lobes de l'épistome plus arrondis et moins prononcés que chez *gaudens*. Vu de dessus, le bord postérieur est faiblement convexe. Mandibules aussi courtes que chez *gaudens* et *Alluandi*. Scape aussi long que les 7 premiers articles du funicule réunis; 2^e article du funicule aussi étroit ou plus étroit que long, le dessous faiblement pubescent vers le bord externe. Pédicule comme chez *Alluandi*.

Très voisin de ce dernier, dont c'est peut-être une simple race, mais les ailes bien plus courtes, la pilosité dressée plus forte sur la tête, le corps un peu plus étroit, les lobes de l'épistome plus prononcés, l'en distinguent facilement.

Congo belge : Lukolela, 28-V-1912 (D^r CHRISTY), 1 ♂; Kabinda (D^r SCHWETZ), 1 ♂. Musée du Congo belge.

Dorylus (Alaopone) montanus SANTS. st. **brevis** n. st. (fig. 1).

♂. Long. : 19-20 mm. Roussâtre. Tête noire. Mandibules brun foncé à bords rougeâtres. Antennes plus claires. Pattes passant du rouge clair au rouge foncé. Mat, irrégulièrement ponctué. Tête plus luisante. Gastre seule-




FIG. 1. — *Dorylus (Alaopone) montanus* SANTS. st. *brevis* n. st.
Armure génitale vue de dessus et de profil.