

Congo belge : Malela, XII-1913 et I-1914 (L. BURGEON). Musée du Congo belge, 2 ♂.

Voisin de *Emeryi* FOR. que je ne connais pas en nature, mais celui-ci a la ponctuation plus fine et le lobe inférieur du pédicule obsolète. Les ailes manquent et l'armure copulatrice est cachée chez ces deux exemplaires.

**Aenictogeton elongatus** SANTS. var. **attenuatus** n. var. ✓✓

♂. Long. : 5,5 mm. Roussâtre clair. Tête et gastre brun roussâtre, dessus du thorax roussâtre. Pilosité et sculpture comme chez le type de l'espèce. Le pédicule un peu plus étroit et moins profondément convexe dessus. Le lobe inférieur n'occupe qu'un peu plus du tiers médian du dessous du nœud. Il est plus haut devant et atténué en arrière. Ailes brunâtres. Du reste comme *elongatus*.

Congo belge : 300 kilom. de Kindu, 21-IV-1914 (L. BURGEON), 1 ♂.

**Aenictogeton sulcatus** n. sp. (fig. 2). ✓✓

♂. Long. : 6 mm. D'un jaune un peu brunâtre. Ailes hyalines saupoudrées d'une fine pubescence brunâtre, nervures et taches brunes. Une pilosité dressée, ondulée et longue sur le front, les côtés du thorax, les cuisses, les




FIG. 2. — Face supérieure du pédicule de :

- a. *Aenictogeton sulcatus* n. sp.
- b. *Aenictogeton elongatus* var. *attenuatus* n. var.
- c. *Aenictogeton elongatus* n. sp.

lobes du pédicule et l'abdomen. Sur le gastre les poils sont aussi longs que la moitié d'un segment et moins nombreux que chez *elongatus*. Sur le thorax la pilosité est un peu plus longue que le diamètre des ocelles. Lisse, avec