

une ponctuation espacée plus fine et surtout moins dense sur le postpétiole que chez *elongatus*. La tête s'élargit en avant. Les yeux en occupent la moitié antérieure des côtés. La fosse du vertex est assez grande pour contenir trois ocelles, son bord postérieur atteint l'articulation du cou. L'ocelle antérieur ne dépasse pas en avant le niveau du bord postérieur des yeux. Le scape atteint le quart postérieur de ceux-ci. Funicule épaissi au milieu, les 3^e-5^e articles plus épais que longs. Thorax un peu moins grêle que chez *elongatus* et moins distinctement rétréci en avant. Le pédicule est aussi long que large en arrière, rétréci en avant avec un sillon médian distinct comme chez *elongatus*, mais plus large. Les lobes postérieurs vus de côtés paraissent acuminés et le nœud aussi long que haut, plus convexe dessus en avant que derrière. Le lobe inférieur est aussi convexe sur le profil que le dos du segment. Aile antérieure longue de 5 mm.

Congo belge : Katak, 1913 (D^r GÉRARD), reçu de M. BONDROIT, 1 ♂.

Paraît très voisin de *Bequaerti* FOR., mais les ailes sont plus claires, la sculpture plus fine.

Tetramorium aculeatum MAYR st. **andricum** EM. var. **gladiator** n. var.

♀. Long. : 4.3-4.8 mm. Noir. Cou, tarsi, dessous des deux nœuds du pédicule et le gastre plus ou moins brun roussâtre. Plus robuste et plus grossièrement sculpté que le type et que *andricum*, les épines presque aussi longues mais plus robustes et plus écartées.

Congo da Lemba, 1913 (R. MAYNÉ), 3 ♀.

Cataulacus Schoutedeni n. sp.

♀. Long. : 4.3-5.3. Noir. Scape et tibiae rouge brunâtre. Mat, finement ponctué, réticulé; la tête a en outre de gros points peu profonds et irrégulièrement clairsemés et un lâche réseau de fines rides. C'est immédiatement derrière leurs anastomoses que se placent les points ci-dessus. Ces rides sont plus denses sur l'occiput, le milieu du dos du thorax et les épines épino-tales, très grossières et irrégulièrement transversales sur les deux nœuds pédiculaires et à peine estompées sur le gastre. Côtés du thorax plus régulièrement fortement et obliquement ridés. Des poils jaunâtres, très courts et tronqués sur les scapes et les pattes, d'autres plus longs sous l'abdomen, le reste glabre. Tête aussi large que longue chez la "♀", plus longue chez la "♂", le