

bord postérieur droit avec les côtés convexes en arrière des yeux et sinueux en avant avec une dent, devant ceux-ci, plus petite que chez *C. Huberi* AND. Épistome plat à bord antérieur transversal et échancré dans son cinquième médian. Aire frontale en triangle allongé suivi d'un sillon frontal de même longueur. Mandibules larges, inermes, éparsément ponctuées. Thorax plus étroit que la tête, à sillons faiblement indiqués, assez fortement convexe d'avant en arrière, surtout le promésotum. Sauf le cou qui en occupe le tiers moyen, le bord antérieur du pronotum est transversal, rectiligne. Un peu plus du tiers moyen des côtés est droit, presque parallèle, légèrement convergent en arrière, le tiers postérieur très oblique en dedans, formant avec la partie précédente un angle net mais inermes. L'angle antérieur obliquement tronqué sans dents ni épines. Mésonotum convexe; les côtés non bordés, droits, convergent fortement vers la base de l'épinotum. La face basale de celle-ci, plus large que longue, armée d'épines robustes, à la base oblique en haut et en dehors (moins oblique que chez *guineensis* SM., plus que chez *Kohli* MAYR), presque aussi longues que la moitié du reste du thorax. Pétiole cuboïde, rétréci en arrière, un peu plus long que large. La face antérieure verticale, les deux tiers antérieurs des côtés parallèles, le tiers restant obliquant en dedans. Vu de profil, il est convexe dessus, pourvu dessous et en avant d'un lobe rectangulaire mousse. Le postpétiole aussi large que le pétiole, la face antérieure convexe, la face postérieure concave, le sommet arrondi avec un sillon médian comme chez les *Crematogaster* et un tout petit lobe en dessous. Gastre ovale, un cinquième plus long que large, la base légèrement échancrée avec une bordure mousse sur les côtés.

♀. Long. : 6 mm. Un peu plus fortement ridée que la ♂, la tête plus longue. La face basale de l'épinotum a de grosses ridés transversales et les épines longues comme la moitié de leur intervalle. Gastre à côtés parallèles, long de 2.4 mm., du reste comme la ♂.

Voisin de *C. tardus* SANTS., mais plus petit; les épines relativement plus longues, la sculpture plus faible.

Congo da Lemba, I-1913 (R. MAYNE), 4 ♂ et 1 ♀.

Polyrhachys (Myrma) Schoutedeni n. sp.

♀. Long. : 4.3 mm. (tête fléchie). Noire. Mâle, densément ponctuée granulée, plus grossièrement sur la tête et le pronotum, gastre simplement ponctué. Une pubescence blanchâtre très fine, courte et clairsemée. Quelques longs poils sur les mandibules, l'épistome et l'extrémité du gastre.

Tête ovoïde, arrondie derrière les yeux qui sont médiocrement convexes et au quart postérieur. Arêtes frontales peu sinueuses et assez parallèles, moins écartées que le diamètre de l'œil. Épistome convexe, transversalement