

## NOUVELLES FOURMIS DU CONGO BELGE

DU

MUSÉE DU CONGO BELGE, A TERVUEREN

PAR

le Dr F. SANTSCHI

I. — *Paltothyreus tarsatus* F.

Cette espèce varie beaucoup, mais certains de ces caractères ont une fixité qui correspond aux principales régions du Continent africain. On peut en distinguer les variétés suivantes :

Var. *tarsatus* FAB.

Les stries des côtés de la tête sont plus fortes, continues et plus régulières; elles sont aussi plus obliques; celles qui passent près du bord externe de l'œil atteignent le bord postérieur de la tête vers son quart externe; mandibules bien striées, l'écaille lisse, le sommet largement arrondi, presque transversal; la taille grande chez les sexués.

♀. Longueur, 25 mm. (avec les mandibules); aile supérieure, 15 mm. Largeur de la tête, 4.5 mm.; maxima du thorax, 4.2 mm.; du gastre, 4.4 mm.

♂. Longueur totale, 19 mm.; de l'antenne, 13-14 mm.; de l'aile antérieure, 13.5-14 mm.

Largeur du thorax, 3.4 mm.; du gastre, 3.7 mm.

Sénégal : type de FABRICIUS ♀.

Côte d'Ivoire : Dimbroko (LE MOULT), ♀; Jacqueline et Grand-