

Bassam (LOHIER), ♀, ♀, ♂ (♀ et ♂ types); Casamance (CLAVEAU), ♀.
Congo français : Fort-Crampel (LE MOULT), ♀.

Var. **mediana** n. var.

Diffère de la variété type par les stries des côtés de la tête qui sont plus irrégulières, interrompues par une nombreuse ponctuation plus fine et plus longitudinale. La face postérieure de l'écaille est plus ou moins striée chez la ♀; son sommet forme une courbe plus étroite et plus fortement arquée chez ♀ et ♀. La taille des sexués est moins avantageuse.

♀. Longueur, 23-24 mm. Largeur de la tête, 4.1-4.3 mm.; du thorax, 3.8 mm.

♂. Longueur totale, 15 mm.; antennes, 13-14 mm. Largeur du thorax, 3.4 mm.; du gastre, 3.4 mm., chez les exemplaires du Gabon.

♂. Longueur, 14 mm.; aile, 11 mm. Largeur du thorax, 3.1 mm.; du gastre, 3.1 mm. (Brazzaville).

Congo français : Brazzaville (WEISS), ♀, ♀ types (? ♂); Ubanghi (R. P. AUGUSTIN); Borda (P. CHARLEUX).

Benguela : Cucala (CRUCHET), ♀ (exemplaires plus grands).

Cameroun : Molundu (REICHENSBERGER).

Var. **subopaca** n. var.

Le dessus du gastre est en grande partie sculpté parfois entièrement de réticulations transversales et submat. L'écaille est striée derrière et au sommet. Le devant de la tête, les côtés du thorax, les appendices, plus ou moins roussâtres. Taille en général plus petite mais variable.

♀. Longueur totale, 21-24 mm.; aile supérieure, 13 mm. Largeur de la tête, 3.3-4 mm.; du thorax, 3.3-4 mm.

♀. Longueur, 17 mm.

Gabon : Sam-Kito (F. FAURE), ♀, ♀.

Var. **delagoensis** EM.

Tandis que les trois variétés précédentes ont un sillon bien dégagé au milieu de l'épistome, chez la variété *delagoensis* (et les deux variétés suivantes) le sillon est plus ou moins comblé par une saillie longitudinale. Mandibules lisses ou très faiblement striolées. Stries latérales de la tête comme chez *mediana*.