

Delagoa (LIEGME); Rhodesia (G. ARNOLD).

Afrique orientale allemande : Kilimandjaro (ALLUAUD) et Pangani (REICHENSPERGER).

Var. **striatidens** n. var.

Épistome comme chez *delagoensis*, mais les dents fortement striées. Stries latérales de la tête plus fortes, comme chez le type.

Afrique orientale anglaise : Kibwey (ALLUAUD), ♀, ♂.

Var. **robusta** n. var.

Partie médiane de l'épistome large et plane, fortement striée avec une saillie médiane. Mandibules striées. Écailles striées derrière. Striation des côtés de la tête plus ou moins effacée. Taille plus robuste.

♀. Longueur, 29 mm.; ailes antérieures, 17 mm. Largeur de la tête, 5 mm.; du thorax, 4.5 mm.; du gastre, 5 mm.

Somalie : Buarsangueli (REVOIL).

FRED. SMITH (1858) décrit, sous le nom de *Pachycondyla similima*, une ♀ de *Paltothyreus tarsatus*, dont le sommet de l'écaille est légèrement échancré; c'est peut-être une variété locale (Cape Colony), mais je ne la connais pas en nature.

Je possède, en outre, un unique exemplaire ♂ d'une petite ♂ *Paltothyreus tarsatus* provenant de la Côte d'Ivoire; l'épistome est sillonné au milieu comme le type; la tête aussi fortement striée, mais les mandibules entièrement lisses. C'est peut-être aussi une variété locale.

CLEF DES VARIÉTÉS.

1. Partie médiane de l'épistome enfoncée en sillon (Afrique occidentale). 2
— Ce sillon est tout ou en partie comblé par une saillie longitudinale (Afrique orientale) 4
2. Côtés de la tête fortement striés; écaille peu arquée au sommet. *P. tarsatus* FAB.
— Stries latérales de la tête moins régulières; convexité plus forte du sommet de l'écaille 3