

3. Gastre et sommet de l'écaille luisant lisse, à ponctuation espacée, plus robuste var. *mediana* n.
— Gastre en grande partie sculpté, taille de la ♀ plus petite, var. *subopaca* n.
4. Mandibules lisses ou très faiblement striées (Afrique du Sud-Est),
var. *delagoensis* EM.
— Mandibules fortement striées (Afrique orientale) 5
5. Taille plus petite de la ♀, stries latérales de la tête plus fortes,
var. *striatidens* n.
— Taille plus grande, côtés de la tête faiblement striés, plutôt ponctués var. *robusta* n. v.

2. — **Pachycondyla (Bothroponera) gabonensis** ANDRÉ
var. **robustior** n. var.

♂. Long. : 9-9.5 mm. Appendices plus sombres que le bord des segments du gastre. Rides de la tête très divergentes tout le long de la ligne médiane. Les fossettes du gastre sont très allongées et lui donnent un aspect strié, du reste, comme le type, mais beaucoup plus robuste.

Congo belge : Banalia, 12-XII (D^r BEQUAERT, n° 96).

3. — **Pachycondyla (Bothroponera) armata** n. sp.

♂. Long. : 8-9.5 mm. Noire. Mandibules, épistome, lobes frontaux, appendices et bord des segments abdominaux rouge brunâtre, segment apical rouge jaunâtre. Pilosité dressée fauve aussi abondante que chez *gabonensis* ANDRÉ. Mandibules lisses avec quelques points. Tête striée réticulée, les stries médianes sont parallèles, les plus externes divergentes, celles qui partent de l'extrémité postérieure des arêtes frontales atteignent le bord postérieur de la tête vers son cinquième externe. Les angles postérieurs et les côtés sont plus réticulés que striés. Stries occipitales lisses avec leurs intervalles lisses. Thorax et face antérieure de l'écaille grossièrement réticulés-ridés, fossulés et luisants dans le fond des fossettes. Face déclive de l'épinotum lisse et luisante. Ponctuation pilifère du gastre courte avec l'intervalle luisant et faiblement chagriné, presque lisse sur le premier segment, plus fortement ponctué et moins luisant sur les segments suivants.

Tête presque carrée, le bord postérieur un peu concave. Les yeux sont aussi grands que l'espace qui les sépare du bord antérieur de la tête et occupent presque le quart de la longueur des côtés; sillon frontal aussi long que les arêtes frontales. L'épistome forme un lobe tronqué devant sans sillon ni dents à son bord antérieur; le milieu est luisant, les côtés réticulés