

rugueux. Mandibules étroites, une dent apicale et une basale avec deux sinuosités intermédiaires sur le bord terminal qui n'est pas très distinct du bord interne. Le scape dépasse légèrement le bord occipital; sauf le dernier, les articles du funicule sont plus larges que longs. Thorax un peu convexe. Les dents épinoles courtes, aussi larges que longues. Écaille épineuse, comme chez *gabonensis*. Les dents externes un peu divergentes et plus longues que chez la var. *striatidens* SANTS., mais bien moins longues que *P. Sveni* FOR. Gastre assez étroit.

Congo belge : Kitempuka (GÉRARD), 1 ♂.

Cette espèce se rapproche de *P. Sveni* par son épistome inerme, mais bien différente de cette espèce et de *gabonensis*, par la sculpture de son abdomen.

4. — *Ponera inaudax* n. sp.

♂. Long. : 2 mm. Jaune roussâtre foncé, appendices jaunes. Lisse avec une très fine ponctuation. Un peu luisante (moins luisante que chez *Abeillei* EM., plus que chez *cæca* SANTS.). Quelques poils dressés, très courts, sur le gastre. Pubescence moyenne comme chez *Abeillei*.

Tête rectangulaire, plus longue que large (comme chez *cæca*), avec les côtés arqués, le bord postérieur à peine échancré; aveugle. Un sillon frontal dépasse un peu le tiers antérieur de la tête. Épistome très court, tronqué, avec une très légère carène médiane. Les mandibules luisantes ont un bord terminal plus court que celui de *cæca*, armé de 5 denticules. Le scape assez épais n'atteint pas tout à fait le sixième postérieur de la tête. Funicule en massue très épaisse de 5 articles. Articles 2 à 6 très courts, plus du double plus larges que longs, plus larges que chez *cæca*. Les 7 à 10 au moins un tiers plus larges que longs. Suture mésonotale obsolète. Pronotum aussi long que large (sans le col), déprimé, à profil presque rectiligne, obliquant légèrement jusqu'à la suture promésonotale, à partir de laquelle le profil du mesoépinothum, également rectiligne, s'incline au contraire légèrement vers l'arrière. Face déclive droite et bordée. Vue de dessus, la face basale de l'épinothum est bien plus étroite que le mésonotum, et n'est pas bordée. L'écaille est épaisse mais moins que chez *cæca*, tronquée derrière, arrondie d'un côté à l'autre devant. Vue du haut, elle est le double plus large derrière que longue au milieu. Le sommet est arqué, un peu plus large que la base. Postpétiole moins haut que l'écaille, aussi large derrière que long, plus court que le segment suivant.

Congo belge : Yambuya, 26-XI (D^r BEQUAERT, n° 82).