

large, le 11 aussi long que la somme des deux précédents. Tous s'épaississent de plus en plus. Thorax un peu plus large au milieu que la tête. Pronotum arrondi, sur le même plan que la face basale de l'épinotum au-dessus desquels le mésonotum et le scutellum forment une légère convexité. Les deux faces de l'épinotum subégales formant ensemble un angle très arrondi. Le pétiole vu de dessus paraît fusiforme, plus du double plus long que large au milieu, bordé, les faces latérales planes, le dessus convexe, le pédicule assez court. Postpétiole en ovale transversal, aussi large que la longueur du pétiole, presque le double plus large que long; le dessous des deux articles inerme. Gstre plus large que le thorax, un peu plus large que le postpétiole. Le fémur postérieur étendu atteint le milieu des côtés du postpétiole.

Sénégal : Saint-Louis (leg. CLAVEAU).

7. — **Melissotarsus major** n. sp.

♂. Long. : 2.6-3.3 mm. Tête et thorax rouge-brun. Appendices et abdomen jaune terne un peu brunâtre. Tête lisse, assez luisante, avec des points allongés espacés et des stries longitudinales vers le bord occipital, devant de la tête faiblement chagriné. Une vingtaine de fortes stries s'allongent sur le thorax. Abdomen lisse très finement réticulé, d'un aspect grasseux, plus luisant vers la base. De longs poils irréguliers, clairsemés, plus abondants sur le milieu de l'épistome, les mandibules, les scapes et les pattes. Pubescence rare et très courte.

Tête comme chez *M. Beccarii* EM., plus étroite devant. Yeux ovales de 30 facettes environ, plus longs que l'espace qui les sépare du bord antérieur de la tête. Mandibules à bord terminal irrégulier avec ou sans forte dent apicale. Le scape atteint l'œil. Le 2<sup>e</sup> article du funicule aussi long qu'épais à l'extrémité. Le 3<sup>e</sup> article quatre à cinq fois plus large que long. Les métatarses moyens sont un peu plus longs que larges (plus longs que chez *Beccarii* et moins que chez *Emeryi*), mais pas plus larges que les tibias. Pétiole un peu plus étroit que chez *Beccarii*. Postpétiole en ovale transversal deux fois plus large que long, bien plus volumineux que chez *pilipes* SANTS.

Diffère des autres espèces par sa grande taille.

Congo belge : Penghe, 13-II (D<sup>r</sup> BEQUAERT, n° 125).

8. — **Crematogaster (Decacrema) solenopsoïdes** EM. st. **flavida** MAYR var. **flaviscapis** n. var.

♀. Long. : 2.8-3 mm. Jaune brunâtre clair, tête et abdomen plus foncés,