

appendices, y compris le scape, jaunes. Pilosité dressée rare et très fine; manque presque sur les appendices. Pubescence clairsemée et courte. Luisante, lisse avec de petits points pilifères très espacés. Quelques fines stries autour des fossettes antennaires, les côtés de l'épinotum et le fond du sillon mésonotal.

Tête à peine plus longue que large, le bord postérieur droit, au tiers moyen avec les angles très arrondis. Les yeux assez plats, grands comme le quart des côtés, en occupent le milieu. Le sillon frontal atteint le milieu de la tête. Aire frontale plus longue que large. Épistome peu convexe. Le scape atteint le quart postérieur de la tête. Articles 3 à 6 du funicule bien plus larges que longs. La bordure de la face déclive du mésonotum se prolonge sur sa face basale. Épines aussi longues que la moitié de l'intervalle de leur base. Pédicule à peine plus large que long, fortement denté en dessous.

Congo portugais : Landana, 15-VIII (D^r BEQUAERT, n^o 14).

Var. **gallarum** SANTS.

Cette variété fait passage au type de l'espèce, mais la pilosité dressée fait presque défaut sur ses appendices. Les yeux sont convexes et la carène médiane du mésonotum n'est pas très constante, toujours très faible, parfois très distincte.

9. — **Crematogaster (Decacrema) solenopsoïdes** EM. st. **costeboriensis** n. st.

♀. Long. : 2 mm. Brun foncé, gastre brun-noir, mandibules, antennes et tarsi roux brunâtre. Devant des joues méso- et épipleuse faiblement strialé, le reste lisse. Pilosité clairsemée, assez abondante sur le thorax et surtout sur les appendices.

Tête un peu plus longue que large, convexe latéralement, les yeux plats. Le bord postérieur presque droit, les angles arrondis. Aire frontale et sillon frontal obsolètes. Épistome peu convexe, largement arrondi en arrière, le bord antérieur transversal, subtronqué et frangé. Le scape atteint le cinquième postérieur. Articles 3 à 6 du funicule plus larges que longs, mais moins larges que chez *flavidula*. Promésonotum convexe. Bords de la face déclive du mésonotum ne se prolongeant pas sur sa face basale. La face basale de l'épinotum bordée de côté, $2\frac{1}{2}$ fois aussi large que longue au milieu, elle passe à la face déclive par une convexité sagittale et une concavité transversale. Les épines sont un peu plus longues que le tiers de leur intervalle. Pédicule trapézoïdal; ses angles antérieurs et postérieurs subdentés;