

au-dessous une dent presque horizontale. Postpétiole un peu moins large que le devant du pétiole. Du reste comme *solenopsoïdes* ÉM.

Côte d'Ivoire : région de San-Pedro (C. PHORE).

Reçue du Muséum de Paris; je l'avais confondue avec le type.

10. — **Crematogaster (Sphaerocrema) rugosa** ANDRÉ.

Congo belge : Avakubi, 3-I (D^r BEQUAERT, n° 106).

Var. **rugaticeps** n. var.

Diffère du type par la sculpture de la tête plutôt grossièrement réticulée que striée en long avec le fond de la sculpture ponctué. Gastre et pédoncule (les deux nœuds) brun rougeâtre. La tête est plutôt plus longue que large et le scape la dépasse légèrement.

Cameroun : Molundu (leg. REICHENSBERGER).

Var. **nigriventris** n. var.

Diffère du type par l'abdomen entièrement noir. La tête et une partie du thorax sont au contraire d'un brun-noir ou rouge sombre. Les mandibules et les joues rouge foncé. La sculpture comme chez le type de l'espèce; la tête est aussi longue que large, plus longue que chez le type, les épines un peu plus longues, du reste semblable.

Côte d'Ivoire : Dimbroko (LE MOULT).

11. — **Crematogaster (Crematogaster) Meneliki** FOR. st. **proserpina** SANTS. var. **pluton** n. var.

D'un brun-marron foncé; derrière de la tête, scapes, massue des antennes, les tibias et souvent l'extrémité du gastre plus obscur. Épines courtes comme chez *proserpina*, avec la même sculpture. Fait passage au type de l'espèce, dont il diffère par ses épines courtes et divergentes, le devant du mésonotum porte une légère carène médiane. Le pétiole, en trapèze arrondi, est concave dessus.

Congo belge : Zambézi, 2-VIII (D^r BEQUAERT, n° 1).