

12. — **Calyptomymex (Dicroapsis) cryptocerus** EM. var. **laevidens** n. var.

♀. Diffère du type par ses mandibules lisses et luisantes (striées chez le type) avec des points espacés. Pour le reste, comme la description du type.

Congo belge : Yambuya, 26-XI (D^r BEQUAERT, n° 83).

13. — **Tetramorium coloreum** MAYR var. **postpetiolata** n. st.

♀. Un peu plus petit que le type, les arêtes frontales un peu moins espacées. Le postpétiole lisse et bien plus large que long (strié et aussi long que large chez le type); il est aussi plus clair, aussi clair que le gastre. La face postéro-supérieure du pétiole est, au contraire, plus rugueuse. Thorax plus rougeâtre, du reste comme le type.

Congo belge : Penghe, 25-I (D^r BEQUAERT, n° 113).

14. — **Xiphomymex Muralti** FOR.

Congo belge : Penghe, 27-I (D^r BEQUAERT, n° 116).

Xiphomymex Muralti FOR. var. **trilineata** n. var. (= **X. Muralti** SANTS., Boll. del Lab. di Zool. gen. e Agrar. della R. Scuola sup. d'Agric. Portici, vol. VIII, p. 368, 1914.

Cette variété diffère du type, qui n'a qu'une seule ride médiane, par la présence de deux autres rides placées chacune entre la médiane et l'arête du scrobe, un peu plus près du milieu. Elles sont aussi longues et parallèles à la médiane, c'est-à-dire qu'elles s'étendent du bord antérieur de l'épistome au bord occipital. La tête est un peu plus large et il y a quelques traces de rides sur le devant du pronotum; pour le reste, comme le type.

Gold Coast : Aburey (SILVESTRI).

15. — **Strumigenys (Cephaloxis) glanduscula** n. var.

♀. Long. : 2-2.2 mm. Jaune roussâtre, mandibules plus roussâtres, à bord denté brunâtre. Tête et thorax finement réticulés, ponctués et mats. Occiput