

et épaules plus luisants. Face antérieure du pétiole plus légèrement réticulé. Reste du pédoncule, gastre et mandibules lisses et luisants. Base du gastre non striée. Pilosité courte, courbée, non clavée. Pilosité longue, faiblement clavée sur le gastre (plus faiblement que chez *Escherichi* FOR., avec la même disposition.

Tête un peu plus courte et plus échancrée derrière que chez *Simoni* EM., les côtés un peu plus convexes. Aire frontale allongée, imprimée et luisante. Épistome relativement plus grand que chez *Escherichi*, les mandibules plus courtes que chez cette dernière, plutôt comme chez *Simoni* EM., de même que les antennes. Quand le scape est récliné, le bout du funicule atteint le milieu des mandibules. Le promésonotum forme une convexité allongée comme chez *Escherichi* FOR. La déclivité formée par le mésonotum, est très oblique et presque rectiligne sur le profil. La face basale de l'épinotum se relève brusquement derrière le sillon métanotal, pour former un plateau presque carré à côtés mousses. Les dents ou épines relativement petites et la face déclive est bordée par une bandelette membraneuse très étroite.

Pédicule du pétiole presque plus long que le nœud, celui-ci aussi large que long, arrondi au sommet. Une bandelette au-dessus de l'article dont la largeur ne dépasse pas la moitié de l'épaisseur du pédicule. Postpétiole aussi long que le nœud précédent, un quart à un tiers plus large que long (bien plus étroit que chez *Escherichi*). Bordé derrière et dessous d'une bandelette membraneuse aussi étroite que celle de l'article précédent.

Intermédiaire entre *Simoni* EM. et *Lujae* FOR. Mais le premier est plus petit et a le pédicule sculpté, de même chez *Lujae*, auquel manquent les bandelettes.

Congo belge : Yambuya, 25-II (D^r BEQUAERT, n° 79).

16. — *Technomyrmex hypoclinoïdes* n. sp.

♀. Long. : 2.5-2.6 mm. D'un jaune brunâtre terne, appendices plus clairs, la moitié distale du funicule rembruni. Très finement chagriné-réticulé. La tête et l'épinotum plus densément que le reste du thorax et celui-ci que le gastre. La tête et l'épinotum presque mats, le reste du thorax et surtout le gastre plus luisants avec un éclat graisseux. Une paire de longs poils sur l'épistome, le pronotum, l'épinotum et le gastre. Quelques poils moyens vers la bouche et l'abdomen. Pubescence rare, plus apparente sur le gastre.

Tête rectangulaire, un quart plus longue que large, un peu rétrécie dans le quart antérieur, les côtés un peu convexes, le bord postérieur transversal avec les angles brièvement arrondis. Les yeux ovales, peu convexes, aussi grands que le quart des côtés de la tête, en occupent à peu près le milieu.