

Sillon frontal nul. Aire frontale grande, faiblement limitée. Épistome médiocrement convexe, largement arrondi entre les courtes arêtes frontales, sans carène, le bord antérieur transversal profondément échancré au milieu, avec l'insertion d'un long poil de chaque côté de cette échancrure. Mandibules lisses, à bord externe très convexe, le bord terminal assez long de 6 à 7 dents subégales. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Articles 2 à 9 du funicule environ aussi épais ou un peu plus épais que longs. Le pronotum convexe, un peu plus large que long, a un gros point pilifère de chaque côté de son milieu. Le mésonotum continue sur le profil la courbe du pronotum, mais elle est moins convexe; il en est séparé par une suture distincte que renforce une légère crête transversale formée par le bord antérieur. Métanotum environ $2\frac{1}{2}$ fois aussi large que long, les stigmates font légèrement saillie sur ses bords. Face basale de l'épinotum plus de quatre fois plus longue que la face déclive dont elle est séparée par une forte arête transversale, rectangulaire, un tiers plus longue que large, brusquement rétrécie au dernier tiers qui sont marqués, ainsi que les angles postérieurs, par de petits tubercules pilifères. La face déclive est fortement concave de haut en bas, surplombée par la crête de délimitation et bien plus large en haut qu'en bas. Le pétiole a une écaille inclinée, mais faisant saillie de toute son épaisseur au-dessus de son pédicule antérieur et dont le sommet est acuminé. Gastre allongé ne couvrant pas l'écaille.

Congo belge : Avakubi, 6-I (D^r BEQUAERT, n° 103). [Plante myrmécophile, n° 1796.]

Espèce très aberrante; son épinotum la fait ressembler à une *Hypoclinea*.

17. — **Plectroctena subterranea** ARN. st. **gabonensis** n. st.

♀. Long. : 9.5 mm. Noire brunâtre; pattes et extrémité de l'abdomen plus rougeâtre; funicule noirâtre. Luisante, lisse avec une ponctuation plus fine que chez *P. minor* EM., et les côtés du thorax striolés comme chez cette espèce. La tête est relativement plus courte que chez *minor*. Les yeux plus petits mais plus grands que chez *subterranea* ARN. (d'environ 50 facettes). La distance qui les sépare du bord antérieur de la tête est moindre que leur longueur. Il s'en faut du double de son épaisseur que le scape atteigne le bord postérieur de la tête. Suture méso-épinotale indiquée par une légère impression transversale. Nœud du pédicule plus long que