

et verticale sur le profil, l'article porte une assez forte dent au dessous et en avant. Le postpétiole est plus large que le thorax et plus long que large, un fort sillon le sépare du premier segment du gastre.

Gabon : Samkita (F. FAURE) un seul exemplaire dont il manque les funicules.

√√ 2. — **Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma** EM.
var. **attenata** n. var.

♀ Diffère du type de l'espèce par sa taille plus svelte. Long. 10 à 10.5 mill., larg. maxima du thorax 1.7 mill (2 mill. chez *pachyderma* type). Le sillon frontal est bien marqué, il est souvent prolongé par une ligne médiane, vierge de gros points, qui atteint le bord postérieur de la tête et que l'on retrouve plus ou moins distincte sur le dos du thorax. La face postérieure du pétiole a de gros points espacés sur un fond lisse et luisant, pour le reste comme chez le type.

Congo belge : N° Gaza (ELSKENS) 2 ♀. = *pachyderma*

√√ 3. — **Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma** EM. var.
postsquamosa n. var.

♀ Long. 11 mill. Noir. Tête rouge, presque noire en arrière. Mandibules et funicule noirâtres. Scape, hanches et cuisses d'un rouge moins sombre que la tête ; lobes frontaux, angle interne des mandibules, tibias d'un rouge plus clair. Les fossettes de l'abdomen un peu plus grandes et plus luisantes que chez *pachyderma* var. *attenuata*, face postérieure de l'écaille striée verticalement et criblée de gros points. Pour le reste, comme chez *attenuata*.

Congo français : Lobaye (RIGGENBACH). = *pachyderma*

√√ 4. — **Pachycondyla (Bothroponera) sanguinea** n. sp.

♀ Long. 10 mill. Voisine de *pachyderma*. Rouge foncé. Tête et pattes d'un rouge plus clair. Funicule, mandibules et tarsi rouge sombre. Mate. Rugueuse avec des fossettes beaucoup moins distinctes sur la tête et le pronotum que chez *pachyderma*, elles sont au contraire, relativement un peu plus grandes sur le reste du corps avec le fond plutôt granulé que strié, (moins grandes et profondes que chez *pumicosa* ROG.). La face postérieure de l'écaille est ponctuée en haut avec des intervalles lisses plus étendus en bas ; sur les côtes de l'article, les fossettes sont entremêlées de fines stries verticales. Pilosité dressée, roussâtre. Un peu plus longue et plus abondante sur la tête que chez *pachyderma* et la pubescence moins riche.

= *pachyderma*