

7. — **Anochetus concinnus** n.sp. — ♀. Long 3 mill. — Noir, tête et appendices d'un jaune brunâtre, luisante. Un éventail de stries à intervalles rugueux part des lobes frontaux pour s'arrêter peu après le milieu de la tête. Le reste est lisse avec une ponctuation fine espacée du double du diamètre de ses points du front à l'occiput, ponctuation qui s'efface sur les côtés de la tête. La face basale de l'épinotum est finement et transversalement ridée rugueuse. Reste du thorax et abdomen lisse et luisants avec des points plus épars que sur la tête. Quelques longs poils sous les mandibulés, les hanches et le gastre. Une pubescence moyenne plus riche sur les appendices.

Tête plus longue que large mais un peu plus courte et un peu moins échancrée que chez *punctatus* SANTS. Yeux convexes plus ou moins allongés, de 25 facettes environ. Sillon frontal large et bien marqué en arrière. Epistome plus court que chez *punctatus*, prolongé entre les lobes et frontaux par une bande rétrécie au milieu. Mandibules longues comme la moitié de la longueur de la tête, dilatées dans leur moitié distale soit le double plus large à leur extrémité qu'à leur base. Bord supéro-interne tranchant, non denté avec une bordure de points foncés. Bord inféro-interne finement denticulé. Dents terminales assez longues. La médiane insérée dans la moitié basale de l'inférieure, son extrémité n'atteint pas le niveau des deux autres. Le scape grêle n'atteint pas tout à fait l'angle postérieur de la tête. Articles 2 à 5 du funicule à peine plus longs qu'épais, les autres plus longs, le premier aussi long que l'avant dernier. Thorax comme chez *punctatus*, mais le mésonotum est moins court et la face basale de l'épinotum un peu plus large devant l'union des deux bords se faisant plus près de la suture antérieure. Dents de l'épinotum moins prononcées. Sommet de l'écaille entière avec une très petite encoche médiane, les bords sont très minces, les côtés subparallèles, abdomen peu rétréci derrière le postpétiote. Très voisin de *punctatus* dont il diffère par sa tête plus courte, sa sculpture plus lisse et son écaille non échancrée.

Congo belge : Lugombé (D' GERARD).

8. — **Aenictus Weissi** SANTS, ♀.

Gabon : Samkita (F. FAURE).

9. — **Sima emacerata** (SANTS).

Congo belge : N'Gazi (ELSKENS) 1 ♀.

10. — **Sima Oberbecki** FOR.

Gabon : Samkita (F. FAURE). Cette espèce est très voisine de la précédente; elle a la tête un peu plus étroite et la suture métaépinotale moins nettement imprimée.